

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА

бактеріальний вагіноз



ФАКТИ

- Бактеріальний вагіноз (бак-те-рі-АЛЬ-ний / ва-гі-НОЗ) (БВ) – це стан, при якому спостерігається розростання деяких видів бактерій у піхві. Захворювання на БВ може призводити до появи таких симптомів, як виділення з піхви.
- БВ часто зустрічається в жінок дітородного віку.
- Миття статевих органів, сечовипускання або спринцювання після статевого акту не запобігають зараженню БВ або захворюваннями, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ).



**Centers for Disease
Control and Prevention**
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА



ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ВИНИКНЕННЯ БВ?

Учені не до кінця розуміють, чому виникає БВ і як краще запобігти його появі. Однак відомо, що поява нового статевого партнера або наявність кількох статевих партнерів підвищує ризик зараження БВ. Щоб знизити ризик зараження БВ:

- Не займайтеся сексом.
- Якщо ви все ж вирішите вести активне статеве життя, обмежте кількість партнерів.
- Не робіть спринцювання.
- Приймайте всі медикаменти, які вам призначено для лікування БВ, навіть якщо симптоми захворювання зникли.



ЯКИМ ЧИНОМ У ЖІНОК ВИНІКАЄ БВ?

Лікарі не до кінця розуміють, яким чином у людей виникає БВ. Захворювання розповсюджується серед жінок, які мають сексуальні стосунки з іншими жінками. Будь-яка жінка може захворіти на БВ, але ризик значно зростає, якщо:

- У вас новий сексуальний партнер або кілька сексуальних партнерів.
- Вам установили внутрішньоматкову спіраль (ВМС) для запобігання вагітності.
- Ви робите спринцювання.

Жінки не можуть заразитися БВ через сидіння унітазів, постільну білизну, у басейні або торкаючися будь-яких предметів навколо. Жінки, які ніколи не мали статевих стосунків, рідко хворіють на БВ.



ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ Є В МЕНЕ БВ?

Лікар має вас оглянути та взяти зразок рідини з піхви, щоб визначити, чи є у вас БВ.

ЯКІ СИМПТОМИ БВ?

Деякі жінки, які хворіють на БВ, не знають, що він у них є, оскільки не мають жодних симптомів. Якщо у вас з'явилися симптоми, ви можете помітити:

- Незвичайні виділення із сильним «рибним» запахом із піхви. Ви, швидше за все, помітите це після сексу.
- Свербіж в області піхви.

КОЛИ ВАРТО ЗРОБИТИ АНАЛІЗ?

Вам потрібно зробити аналіз на БВ, якщо у вас спостерігаються будь-які симптоми (наприклад, виділення з піхви) або якщо у вашої статевої партнерки є БВ чи симптоми, що можуть свідчити про наявність БВ.

ЧИ МОЖУ Я ЗНОВУ ЗАРАЗИТИСЯ БВ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ?

Так, ви можете повторно заразитися БВ.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА



ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я ВАГІТНА?

Якщо ви вагітні та хворієте на БВ:

- Ви з більшою ймовірністю можете народити передчасно.
- Ваша дитина, швидше за все, матиме недостатню вагу (менше 5 фунтів (2,3 кг) при народженні).



ЯК ЛІКУВАТИ БВ?


- БВ можна вилікувати антибіотиками.
- Прийміть усі ліки, щоб бути впевненими, що ви вилікувалися.
- Не діліться своїми ліками з іншими. Вам потрібні вони всі.
- Якщо після завершення лікування у вас залишилися симптоми, повторно зверніться до лікаря.

ЩО СТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО Я НЕ ЛІКУВАТИМУСЯ?

- Зростає ризик захворіти на інші ЗПСШ,

ЯКЩО В МЕНЕ БВ, ТО ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ МОГО ПАРТНЕРА?

Партнери чоловічої статі не потребують лікування БВ, але захворювання розповсюджується серед жінок, які мають сексуальні стосунки з іншими жінками. Це означає, що якщо ви хворієте на БВ і у вас є статевий партнерка, вона також може мати БВ.



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ТА СВОГО ПАРТНЕРА.

Відкрито й чесно поговоріть зі своїм партнером про ЗПСШ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Проконсультуйтеся з лікарем.
- Зателефонуйте за номером 1-800-CDC-INFO.
- Відвідайте вебсайт www.cdc.gov/std/bv.



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention