


ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ + ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО ПАРТНЕРА

гонорея



ФАКТЫ

- Гонорея — это заболевание, передающееся половым путем (ЗППП).
- Гонореей может заразиться любой сексуально активный человек, хотя чаще она встречается у молодежи и подростков.
- Многие люди, страдающие гонореей, не знают об этом. Болезнь часто протекает бессимптомно, особенно у женщин.
- Гонорею можно передать другим, даже не подозревая об этом.
- Правильно подобранные препараты полностью излечивают от гонореи.
- Если гонорею не лечить, она может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем.



**Centers for Disease
Control and Prevention**
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention



КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ГОНОРЕЕЙ?

- Самый надежный способ избежать заражения гонореей — не вступать в половые отношений либо иметь половые отношения только с тем человеком, кто не инфицирован и вступает в половые отношения только с вами.
- Презервативы снижают риск заражения гонореей при условии их правильного использования во время каждого полового акта.
- Промывание половых органов, мочеиспускание или спринцевание после полового акта не предотвратят ни одно ЗППП.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ГОНОРЕЕЙ?

Гонореей можно заразиться при половом акте с человеком, у которого она уже есть. «Половой акт» означает анальный, оральный или вагинальный секс.

Во время беременности женщина, инфицированная гонореей, может передать инфекцию ребенку.



ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ + ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО ПАРТНЕРА

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГОНОРЕИ?

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА

Гонорея может поражать анус, глаза, рот, горло, органы мочевыделительной системы или матку. При этом может не быть никаких симптомов. При наличии симптомов они зависят от места инфицирования.

В случае инфицирования матки или органов мочевыделительной системы могут наблюдаться такие симптомы:

- вагинальное кровотечение между менструациями;
- боль или жжение при мочеиспускании;
- увеличение выделений из влагалища.

В случае инфицирования прямой кишки могут наблюдаться такие симптомы: зуд, болезненные ощущения в прямой кишке, кровотечение или выделения из нее, боль при опорожнении.

В случае инфицирования горла оно может быть болезненно раздраженным.

ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА

Гонорея может поражать анус, глаза, рот, горло или половой член. При этом может не быть никаких симптомов. При наличии симптомов они зависят от места инфицирования.

В случае инфицирования полового члена могут наблюдаться такие симптомы:

- боль или жжение при мочеиспускании;
- выделения из полового члена;
- отекание или болезненность яичек.

В случае инфицирования прямой кишки могут наблюдаться зуд, болезненные ощущения в прямой кишке, кровотечение или выделения из нее, боль при опорожнении.

В случае инфицирования горла оно может быть болезненно раздраженным.



КОГДА СЛЕДУЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ?

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА

Вам следует сдать тест на гонорею, если:

- вам еще не исполнилось 25 лет и вы ведете половую жизнь;
- вам уже исполнилось 25 лет и у вас несколько половых партнеров;
- вам уже исполнилось 25 лет и у вас новый половой партнер;
- у вашего партнера гонорея либо у вас или вашего партнера проявляются симптомы, которые могут указывать на гонорею;
- у вас есть другое ЗППП, например хламидиоз;
- вы беременны (в этом случае уточните у своего врача, нужно ли сдавать анализ на гонорею).

ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА

Вам следует сдать тест на гонорею, если:

- у вашего партнера гонорея либо у вас или вашего партнера проявляются симптомы, которые могут указывать на гонорею;
- у вас есть другое ЗППП, например хламидиоз;
- вы ведете активную половую жизнь и при этом гомосексуальны, бисексуальны или занимаетесь сексом с мужчиной (в таких случаях тест на гонорею лучше сдавать ежегодно).

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ГОНОРЕЯ?

Обратитесь к врачу, чтобы сдать тест на гонорею.

КАК ЛЕЧИТСЯ ГОНОРЕЯ?

- Гонорею лечат антибиотиками.
- Завершите прием всех лекарственных препаратов, чтобы точно знать, что вы выздоровели.
- Ни с кем не делитесь своими лекарственными препаратами, вам необходимо принять их все.
- Если после курса лечения у вас все еще сохраняются симптомы, снова обратитесь к врачу.



МОЖНО ЛИ СНОВА ЗАРАЗИТЬСЯ ГОНОРЕЕЙ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ?

Да, гонореей можно заразиться повторно. Вы можете заразиться от партнера, который не проходил лечение, или от нового партнера.



ЕСЛИ У МЕНЯ ГОНОРЕЯ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ МОЕГО ПАРТНЕРА?

- У вашего партнера тоже может быть гонорея.
- Обязательно расскажите о заболевании своим недавним половым партнерам, чтобы они могли сдать анализы и пройти курс лечения.
- Избегайте половых контактов, пока вы и ваш партнер не окончите курс лечения, чтобы не заразить друг друга повторно.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПРОЙТИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ?

Если гонорей не лечить, она остается в организме. При этом повышается риск заразиться ВИЧ в случае незащищенного секса с ВИЧ-инфицированным партнером. Кроме того, гонорея может попасть в кровь или вызвать поражение суставов. Это очень серьезное осложнение.

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА

- Гонорея может поразить матку или фаллопиевы трубы и вызвать воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ) — серьезную инфекцию, развивающуюся, когда гонорея распространяется на репродуктивные органы.
- ВЗОМТ приводит к нарушениям, в результате которых женщина может утратить способность забеременеть.
- Не вылеченная гонорея может стать причиной хронических болей в области малого таза.
- Больная гонореей мать может передать инфекцию своему ребенку во время родов. Гонорея может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у новорожденных.



ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА

- Могут появиться болезненные ощущения в яичках. В редких случаях эта инфекция может привести к бесплодию.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ + ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО ПАРТНЕРА



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОЕГО ПАРТНЕРА

Если ваш партнер проходит лечение от гонореи, обязательно обратитесь к врачу. Также обратитесь к врачу, если вы или ваш половой партнер заметили какие-либо симптомы, например необычные выделения.

Если у вас гонорея, сдайте тест и на другие ЗППП. Обязательно расскажите о заболевании своим недавним половым партнерам, чтобы они также сдали анализы. Открыто и честно поговорите со своим партнером о гонорее и других ЗППП.



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Обратитесь к своему врачу.
- Позвоните по телефону 1-800-CDC-INFO.
- Посетите сайт www.cdc.gov/std/trichomonas.



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention