


ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА

# гоноорея



## ФАКТИ

- Гонорея (го-но-РЕ-я) – це захворювання, що передається статевим шляхом (ЗПСШ).
- Будь-яка сексуально активна людина може заразитися гонореєю. Вона частіше виникає в підлітків і молоді.
- Більшість людей, хворих на гонорею, не знають про це. Це захворювання часто не має симптомів, особливо в жінок.
- Гонорею можна передати комусь іншому, не здогадуючись про це.
- Гонорею можна вилікувати, підібравши правильний курс лікування.
- Якщо не лікувати гонорею, вона може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.



**Centers for Disease  
Control and Prevention**  
National Center for HIV/AIDS,  
Viral Hepatitis, STD, and  
TB Prevention



## ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ЗАРАЖЕННЯ ГОНОРЕЄЮ?

- Найнадійніший спосіб запобігти зараженню гонореєю – не мати статевих стосунків або мати їх тільки з людиною, яка не хворіє на гонорею та має статеві стосунки тільки з вами.
- Використання презервативів знижує ризик зараження гонореєю за умови правильного використання під час кожного статевого акту.
- Миття статевих органів, сечовипускання або приймання душі після статевого акту не запобігають зараженню ЗПСШ.

## ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ГОНОРЕЄЮ?

Заразитися гонореєю можна під час статевого акту з кимось, хто має це захворювання. «Статевий акт» означає анальний, оральний або вагінальний контакт.

Якщо ви вагітні та маєте гонорею, ви можете передати інфекцію дитині.



ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА

## ЯКІ СИМПТОМИ ГОНОРЕЇ?

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖІНОК

Заразитися гонореєю можна через контакт з анусом, очима, ротом, горлом, сечовивідними шляхами чи статевими органами. Ви можете не помічати жодних симптомів. Якщо у вас з'являться симптоми, вони можуть відрізнятися залежно від того, яку частину тіла інфіковано.

Якщо гонорея вразила статеві органи чи сечовивідні шляхи, ви можете помітити такі симптоми:

- Вагінальна кровотеча між менструаціями.
- Біль або печіння під час сечовипускання.
- Посилені виділення з піхви.

Якщо гонорея вразила пряму кишку, ви можете помітити такі симптоми: свербіж, болісні відчуття, кровотеча, виділення з прямої кишки або біль під час випорожнення.

Якщо гонорея вразила горло, ви можете відчувати біль у ньому.

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

Заразитися гонореєю можна через контакт з анусом, очима, ротом, пенісом або горлом. Ви можете не помічати жодних симптомів. Якщо у вас з'являться симптоми, вони можуть відрізнятися залежно від того, яку частину тіла інфіковано.

Якщо гонорея вразила пеніс, ви можете помітити такі симптоми:

- Біль або печіння під час сечовипускання.
- Виділення з пеніса.
- Біль у яєчках або їх набрякання.

Якщо гонорея вразила пряму кишку, ви можете помітити такі симптоми: свербіж, болісні відчуття, кровотеча, виділення з прямої кишки або біль під час випорожнення.

Якщо гонорея вразила горло, ви можете відчувати біль у ньому.



## КОЛИ ВАРТО ЗРОБИТИ АНАЛІЗ?

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖІНОК

Аналіз на гонорею варто робити в таких випадках:

- Вам менше ніж 25 років і ви маєте статеві стосунки.
- Вам 25 років і більше й ви маєте статеві стосунки з більш ніж одним партнером.
- Вам 25 років і більше й у вас з'явився новий статевий партнер.
- У вас з'явилися будь-які із симптомів або у вашого партнера виявлено гонорею чи симптоми, що можуть свідчити про її наявність.
- Ви маєте інше ЗПСШ, як-от хламідіоз.
- Якщо ви вагітні, запитайте в лікаря, чи потрібно робити аналіз на гонорею.

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

Аналіз на гонорею варто робити в таких випадках:

- У вас з'явилися будь-які із симптомів або у вашого партнера виявлено гонорею чи симптоми, що можуть свідчити про її наявність.
- Ви маєте інше ЗПСШ, як-от хламідіоз.
- Якщо ви сексуально активний гей чи бісексуал або маєте статеві стосунки з чоловіками, вам варто щороку робити аналіз на гонорею.

## ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ ХВОРІЮ Я НА ГОНОРЕЮ?

Зверніться до лікаря, щоб зробити аналіз на гонорею.

## ЯК ЛІКУВАТИ ГОНОРЕЮ?

- Гонорею можна вилікувати антибіотиками.
- Пройдіть повний курс лікування, щоб упевнитися в одужанні.
- Не діліться своїми ліками ні з ким. Потрібно пройти повний курс.
- Якщо після завершення лікування у вас залишилися симптоми, повторно зверніться до лікаря.



## ЧИ МОЖУ Я ПОВТОРНО ЗАРАЗИТИСЯ ГОНОРЕЮ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ?

Так, ви можете повторно заразитися гонореєю. Ви можете заразитися від партнера, що не лікувався, або від нового партнера.



## ЯКЩО В МЕНЕ ГОНОРЕЯ, ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ МОГО ПАРТНЕРА?

- У вашого партнера також може бути гонорея.
- Обов'язково повідомте своїх нещодавніх статевих партнерів, щоб вони також могли зробити аналізи та пройти лікування.
- Уникайте статевих контактів, поки обоє не завершите курс лікування, щоб не заразити один одного повторно.

## ЩО СТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО Я НЕ ЛІКУВАТИМУСЬ?

Гонорея залишається в організмі, якщо її не лікувати. Може підвищитися ризик заразитися ВІЛ-інфекцією під час незахищених статевих актів із ВІЛ-інфікованим партнером. Крім того, гонорея може поширитися й уразити кров або суглоби. Ці захворювання можуть бути дуже небезпечними.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖІНОК

- Гонорея може поширитися й уразити матку або фаллопієві труби, спричинивши запальні захворювання органів малого таза (ЗЗОМТ) – серйозні інфекційні захворювання, що виникають у разі поширення гонореї з ураженням репродуктивних органів.
- Крім того, ЗЗОМТ можуть завдати шкоди, унаслідок якої ви не зможете завагітніти.
- Якщо гонорею не лікувати, вона може спричинити хронічний біль в області таза.
- Якщо у вас гонорея, яку не лікували, ви можете передати інфекцію своїй дитині під час пологів. Гонорея може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям у новонароджених.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

- У вас можуть виникати болісні відчуття в яєчках. У рідкісних випадках це може завдати вам зачати дитину.



ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ

### ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ТА СВОГО ПАРТНЕРА.

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо ваш партнер проходить лікування гонореї. Крім того, зверніться до лікаря, якщо у вас або вашого статевого партнера з'являться будь-які симптоми, як-от незвичайні виділення.

Якщо у вас гонорея, вам варто зробити аналізи на інші ЗПСШ. Обов'язково повідомте своїх нещодавніх статевих партнерів, щоб вони також могли здати аналізи. Відкрито й чесно поговоріть зі своїм партнером про гонорею та інші ЗПСШ.



## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Проконсультуйтеся з лікарем.
- Зателефонуйте за номером 1-800-CDC-INFO.
- Відвідайте вебсторінку [www.cdc.gov/std/trichomonas](http://www.cdc.gov/std/trichomonas).



**Centers for Disease Control and Prevention**  
National Center for HIV/AIDS,  
Viral Hepatitis, STD, and  
TB Prevention