

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА

# сифіліс



## ФАКТИ

- Сифіліс – це захворювання, що передається статевим шляхом (ЗПСШ).
- Кожен може заразитися сифілісом.
- Більшість людей, які мають сифіліс, не знають про це. Ви можете бути хворим на сифіліс, навіть якщо не помічаєте жодних симптомів.
- Першим симптомом є безболісна, кругла й червона виразка, яка може з'явитися в будь-якому місці, де у вас був статевий акт.
- Сифіліс можна передати комусь іншому, не здогадуючись про це.
- Миття статевих органів, сечовипускання або спринцювання після статевого акту не запобігають зараженню сифілісом.
- Сифіліс легко піддається лікуванню та виліковується.
- Якщо не лікувати сифіліс, він може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.



**Centers for Disease  
Control and Prevention**  
National Center for HIV/AIDS,  
Viral Hepatitis, STD, and  
TB Prevention



## ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ СИФІЛІСОМ?

- Заразитися сифілісом можна під час статевого акту з кимось, у кого він є. «Статевий акт» означає оральний, анальний або вагінальний контакт.
- Ви можете заразитися сифілісом, якщо торкнетеся ротом, статевими органами або іншою частиною тіла сифілітичної виразки у хворої на сифіліс людини.
- Якщо ви вагітні, то можете передати сифіліс своїй дитині, навіть якщо не знаєте, що ви інфіковані.



## ЧИ МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ СИФІЛІСОМ ПІД ЧАС ОРАЛЬНОГО СЕКСУ?

Так. Сифілітичні виразки можуть бути як у роті, так і на статевих органах. Якщо ви займаєтесь оральним сексом, то можете заразитися сифілісом. Це дійсно так, навіть якщо ви не бачите виразки. Використання презерватива під час орального сексу може зменшити ризик зараження.

## ЧИ МОЖУТЬ ВАГІТНІ ЖІНКИ ЗАРАЗИТИСЯ СИФІЛІСОМ?

Так, жінка може заразитися сифілісом, якщо вона вагітна. Вагітність не захищає вас або вашу дитину від будь-яких ЗПСШ.

Якщо ви вагітні та вважаєте, що у вас може бути сифіліс, негайно зверніться до лікаря, тому що ви можете передати інфекцію дитині під час вагітності.

Сифіліс надзвичайно небезпечний для немовлят. Ваш лікар може порекомендувати ліки, які можна безпечно приймати під час вагітності.



# ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА



## ЯКІ СИМПТОМИ СИФІЛІСУ?


Захворювання має чотири стадії: первинну, вторинну, латентну та третинну.

### СИМПТОМИ ПЕРВИННОЇ СТАДІЇ

Під час первинної стадії сифілісу у вас може з'явитись одна або декілька безболісних виразок на статевих органах або в роті, анусі чи прямій кишці. Цей тип виразки називається шанкр.

Виразка, швидше за все, буде там, де ви мали статевий акт. Якщо ви займались оральним сексом, вона може бути в роті або на статевих органах. Вона не болить, тому ви можете навіть не помітити, що у вас є виразка, якщо не будете її шукати.

Виразка залишається від 3 до 6 тижнів і заживає сама собою. Якщо ви не будете лікуватися, хвороба перейде до наступної стадії.



### СИМПТОМИ ВТОРИННОЇ СТАДІЇ

Під час вторинної стадії сифілісу може з'явитися висип на долонях і ступнях або на інших частинах тіла. Сифілітичні висипання часто мають червоний або коричневий колір і зазвичай не сверблять. Серед інших симптомів можуть бути лихоманка, біль у горлі, біль у м'язах, головний біль, випадіння волосся та відчуття втоми. Ці симптоми можуть зникнути самостійно. Якщо ви не будете лікуватися, хвороба перейде до наступної стадії.

### СИМПТОМИ ЛАТЕНТНОЇ СТАДІЇ

Під час латентної стадії захворювання у вас немає ніяких симптомів, але хвороба може бути виявлена лікарем завдяки аналізу крові. У латентній стадії сифіліс може залишатися прихованим протягом багатьох років.

### СИМПТОМИ ТРЕТИННОЇ СТАДІЇ

Третинна стадія сифілісу дуже серйозна. Вона може початися після стадії сифілісу, коли ви не лікувалися від хвороби протягом деякого часу, можливо, багатьох років, навіть якщо ви ніколи не помічали симптомів. Серед симптомів третинного сифілісу можуть бути труднощі під час руху рук і ніг, параліч, оніміння, сліпота та хвороби серця.



## ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ Є В МЕНЕ СИФІЛІС?

Зверніться до лікаря, щоб зробити аналіз крові на сифіліс.

### КОЛИ ВАРТО ЗРОБИТИ АНАЛІЗ?

Аналіз на наявність сифілісу варто робити в таких випадках:

- У вас є будь-які симптоми, як-от безболісна кругла виразка, яка може з'явитися на статевих органах або в роті.
- У вашого партнера є сифіліс або симптоми, які можуть свідчити про його наявність, навіть якщо у вас немає симптомів.
- Аналіз на наявність сифілісу варто робити кожній вагітній жінці. Повідомте лікаря, що плануєте завагітніти.

## ЯК ЛІКУВАТИ СИФІЛІС?

Один укол пеніциліну, антибіотика, вилікує людину, яка хворіла на сифіліс менше року. Для лікування людини, яка хворіє на сифіліс більше року, потрібно більше доз.

## ЧИ МОЖУ Я ЗНОВУ ЗАРАЗИТИСЯ СИФІЛІСОМ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ?

Так, ви можете знову заразитися сифілісом. Ви можете заразитися від партнера, що не лікувався, або нового партнера, що є інфікованим.

## ЯКЩО В МЕНЕ Є СИФІЛІС, ТО ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ МОГО ПАРТНЕРА?

- У вашого партнера також може бути сифіліс.
- Обов'язково повідомте своїх нещодавніх статевих партнерів, щоб вони також могли зробити аналізи та пройти лікування.
- Уникайте статевих контактів, доки ви обидва не пройдете лікування, щоб не заразити один одного повторно.
- Уникайте сексуальних контактів із будь-ким, якщо ви побачили незвичну виразку.



## ЩО СТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО Я НЕ ЛІКУВАТИМУСЬ?

- Сифіліс залишається в організмі, якщо його не лікувати.
- Він може вразити серце, мозок, очі та інші органи. Ці ураження можуть не проявлятися протягом багатьох років і можуть призвести до смерті.
- Ви також можете передати хворобу іншим людям.

## ЧИ ВПЛИВАЄ СИФІЛІС НА РИЗИК ІНФІКУВАННЯ ВІЛ?

Так. У вас вищі шанси заразитися ВІЛ, якщо ви маєте сифіліс. Якщо у вас є сифіліс і ВІЛ, ви можете легше поширювати обидві хвороби.

## ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ЗАРАЖЕННЯ СИФІЛІСОМ?

- Найнадійніший спосіб запобігти зараженню сифілісом – не мати статевих відносин або мати статеві відносини тільки з тими, у кого немає сифілісу або хто має статеві відносини тільки з вами.
- Використання презервативів знижує ризик зараження сифілісом за умови правильного використання під час кожного статевих акту. Проте презерватив захищає лише ту частину тіла, яку покриває. Зараження може виникнути на тих частинах, які презерватив не покриває.
- Раз на рік здавайте аналіз крові в лікаря, щоб знати, чи немає у вас сифілісу.



## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ

### ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ТА СВОГО ПАРТНЕРА.

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо ваш партнер проходить лікування сифілісу. Вам і вашому партнеру потрібно лікуватися. Також зверніться до лікаря, якщо у вас або вашого партнера з'являться будь-які симптоми, наприклад болісна червона виразка. Якщо у вас є сифіліс, вам варто зробити аналізи на інші ЗПСШ. Обов'язково повідомте своїх нещодавніх статевих партнерів, щоб вони також могли зробити аналізи. Відкрито й чесно поговоріть зі своїм партнером про сифіліс та інші ЗПСШ.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Проконсультуйтеся з лікарем.
- Зателефонуйте за номером 1-800-CDC-INFO.
- Відвідайте вебсайт [www.cdc.gov/std/syphilis](http://www.cdc.gov/std/syphilis).



Centers for Disease  
Control and Prevention  
National Center for HIV/AIDS,  
Viral Hepatitis, STD, and  
TB Prevention

CS263043D