

Мрох

(прежнее название — монкеурох)

Что нужно знать

Мрох (прежнее название — монкеурох, вирус оспы обезьян) вызывает заболевание, при котором может возникать сыпь и другие симптомы. Узнайте, как защитить себя и близких от мрох.

Мрох распространяется при тесном контакте с человеком, у которого проявляются симптомы.



Мрох распространяется посредством прямого контакта с кожей или биологическими жидкостями зараженного человека (в том числе при сексуальном/тесном контакте). Кроме того, этот вирус может передаваться через прикосновение к зараженным предметам (например, постельному белью, одежде, фетиш-аксессуарам или секс-игрушкам), а также воздушно-капельным путем во время прямого и продолжительного личного контакта. Плод в утробе матери или новорожденный также может заразиться им.



У мрох могут быть разные симптомы.

Обычно мрох вызывает сыпь, которая сначала имеет вид плоских пятен, но со временем превращается в наполненные жидкостью волдыри и может причинять боль. У одних людей появляется лишь несколько пятнышек на одной из частей тела. Другие же могут покрыться пятнами полностью. В число других симптомов входят высокая температура, головная боль и увеличение лимфоузлов.



Ограничить распространение невозможно без профилактики.

Избегайте контакта с кожей тех, у кого есть открытые раны или сыпь, и не обменивайтесь с ними одеждой или другими вещами. Сократите количество людей, с которыми вы вступаете в тесный, интимный или сексуальный контакт. Если вы контактировали с больным или подвергаетесь высокому риску заражения, обратитесь за вакциной от мрох.

Люди, контактирующие с больными мрох или подверженные повышенному риску, могут получить вакцину.



Если симптомы еще не появились, прививка в течение четырех дней с момента контакта может помочь сократить или предотвратить их проявление. Вы также можете сделать прививку, если считаете, что находитесь в группе высокого риска заражения мрох. Обратитесь к своему врачу или в местную больницу.

Немедленно обращайтесь за помощью.



Если у вас появилась новая или необъяснимая сыпь и вам кажется, что причиной может быть мрох, обратитесь к своему врачу или в местную больницу. Для лечения мрох доступны противовирусные препараты. Их можно получить, если у вас есть сильная боль или другие тяжелые симптомы, а также такие сложности, как ослабленная иммунная система, что увеличивает вероятность тяжелого течения болезни.

Если у вас произошел контакт с носителем трох:

Если вы контактировали с больными и у вас еще нет симптомов, обратитесь к врачу, чтобы пройти вакцинацию.

Как пройти вакцинацию?

Люди, тесно контактировавшие с больными или подверженные повышенному риску заражения, могут пройти вакцинацию у своего врача или в местной больнице.

Важное о вакцинах

Привившись от трох, вы все равно должны соблюдать остальные меры предосторожности, в том числе избегать контактов с кожей зараженных трох. Вакцинация будет считаться полной только через две недели после введения второй дозы вакцины. Если у вас появятся симптомы трох после вакцинации, необходимо сделать тест.

Если вы подозреваете, что заразились трох:

- Укройте сыпь.
- Самоизолируйтесь от других людей.
- Немедленно поговорите с врачом. Очень важно позвонить как можно скорее после появления предполагаемых симптомов болезни.

Если у вас диагностировали трох:

Пока струпья не опадут и кожа под ними не заживет, соблюдайте следующие правила:

- Изолируйте себя от других людей и животных (млекопитающих, включая домашних питомцев и грызунов).
- Позаботьтесь о том, чтобы вместе с вами дома без крайней на то необходимости не находились ваши родные, друзья или посетители.
- Не позволяйте окружающим прикасаться к вашей коже, особенно к участкам с сыпью.
- Не оставляйте сыпь открытой.
- Не используйте постельное белье, полотенца, посуду и столовые приборы вместе с другими людьми.
- Чаще мойте руки с мылом и водой или используйте антисептик на спиртовой основе. Чтобы укрыть сыпь на руках, подумайте об использовании одноразовых перчаток.
- Стирайте свои вещи и мойте свою посуду.
- Организуйте регулярную очистку и дезинфекцию поверхностей и вещей, к которым часто прикасаются.
- Избегайте использования контактных линз, чтобы предотвратить случайное заражение глаз.
- Не целуйте, не обнимайте, не прижимайте к себе других людей, не спите вместе с другими, не играйте в спортивные игры и не занимайтесь сексом.
- Носите плотно прилегающую маску, особенно при посещении врача или при наличии высокой температуры и респираторных симптомов.



Для получения подробной информации перейдите на веб-страницу doh.wa.gov/Мрoх.

DOH 348-907 November 2023 Russian

Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.