

¿Su hijo tiene

# ALERGIA A LA PENICILINA?

Hable con su proveedor para asegurarse de que su hijo reciba el mejor antibiótico para su infección.



## Datos sobre la alergia a la penicilina en la infancia:

Más del 95 por ciento de los niños identificados como alérgicos a la penicilina no tienen una alergia real.

Las alergias a la penicilina no son hereditarias (no se transmiten de padres a hijos).

## ¿Por qué es importante identificar las alergias a la penicilina?

**Queremos recetar el mejor antibiótico para la infección a tratar.** La penicilina y otros antibióticos similares suelen funcionar mejor para ciertas infecciones como la faringitis estreptocócica y las infecciones de oído.

### Otros antibióticos pueden tener desventajas.

A menudo, los niños con una alergia a la penicilina identificada reciben otros antibióticos que causan más efectos secundarios. Además, estas alternativas pueden dañar las "bacterias buenas" del cuerpo de su hijo. Algunas alternativas a la penicilina tienen mal sabor, lo que dificulta que los niños las tomen.

## Si no es una alergia, ¿qué causa los síntomas de mi hijo?

Es posible que su hijo haya experimentado efectos secundarios de la penicilina u otro medicamento, que pueden confundirse con una reacción alérgica. Un efecto secundario es un síntoma causado por el medicamento, como dolor de estómago o diarrea.

1. Joerger T, y otros. J Pediatric Infect Dis Soc. 27 de febrero de 2023;12(2):92-98.
2. AAAAI. Penicillin Allergy FAQ. Actualizado en septiembre de 2023.
3. Khan DA, y otros. J Allergy Clin Immunol. Diciembre, 2022;150(6):1333-1393
4. Exius R, y otros. J Allergy Clin Immunol Pract. Noviembre, 2021;9(11):4060-4066.
5. Chow TG, y otros. Ann Allergy Asthma Immunol. Mayo, 2023;130(5):667-669.

420-612 DOH CS Spanish, agosto, 2024. Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas de audición deben llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a [doh.information@doh.wa.gov](mailto:doh.information@doh.wa.gov).

Es posible que su hijo haya sufrido una infección viral que generó un sarpullido. En ocasiones, se cree de manera errónea que estos sarpullidos virales son causados por una alergia a la penicilina.

## ¿Cómo se manifiesta una verdadera alergia?

Una reacción alérgica es causada por la reacción del sistema inmunológico a un medicamento. Las reacciones alérgicas pueden incluir erupciones pruriginosas, urticaria, labios hinchados, dificultad para respirar, sibilancias y anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede ser potencialmente mortal si no se trata de inmediato.

Las alergias son poco frecuentes. Generalmente, ocurren cada vez que se toma un determinado medicamento. Las reacciones alérgicas ocurren de inmediato o poco después de tomar un medicamento.

## ¿Hay una forma segura de verificar si la alergia a la penicilina de mi hijo es real?

**Sí.** Un proveedor de atención médica puede evaluar a los niños con síntomas de alergia a la penicilina. Esto implica hacer preguntas para determinar si el historial de reacciones de su hijo coincide con reacciones alérgicas.

En algunos casos, un niño necesita una evaluación formal de alergias. Esto generalmente implica administrar al niño una dosis de prueba del antibiótico en un entorno seguro y monitoreado, con atención médica disponible en caso de una reacción. Proveedores de atención médica capacitados han administrado las dosis de prueba con éxito a niños de hasta 2 años. La mayoría de los padres indican estar satisfechos con la experiencia de la dosis de prueba y la recomendarían a otros.



Seattle Children's®

