

कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटरोबैक्टेरेलिस (CRE)

अस्पतालों में फैलने वाला एक ऐसा रोगाणु
जिन पर दवाओं का असर नहीं होता



कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटरोबैक्टेरेलिस क्या होते हैं?

एंटरोबैक्टेरेलिस नामक रोगाणु आमतौर पर हमारी आंतों में रहते हैं, और इनसे कोई समस्या नहीं होती। जब एंटरोबैक्टेरेलिस शरीर के ऐसे अंगों में प्रवेश कर जाते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, तो उनसे जानलेवा संक्रमण हो सकता है। ऐसा खासतौर पर अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों में होता है। जब इन रोगाणुओं पर कार्बापेनम जैसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक का असर होना खत्म हो जाता है, तो उनका इलाज और मुश्किल हो जाता है और वे अधिक खतरनाक हो जाते हैं। कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटरोबैक्टेरेलिस को संक्षेप में CRE कहा जाता है।

कॉलोनाइज़ेशन का क्या मतलब है?

मरीजों में CRE की उपस्थिति और वृद्धि हो सकती है। कॉलोनाइज़ेशन का मतलब है कि लोगों के शरीर पर या शरीर के अंदर CRE मौजूद तो होता है, लेकिन उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते। शरीर में CRE का कॉलोनाइज़ेशन कई महीनों या सालों तक जारी रह सकता है। जिन लोगों में ये रोगाणु मौजूद हैं, वे इन्हें दूसरों तक भी फैला सकते हैं।

कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटरोबैक्टेरेलिस को एक समस्या क्यों माना है?

अगर सही तरीके से सफाई न की जाए, तो CRE स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के हाथों, उपकरणों और सतहों के माध्यम से अस्पतालों या उपचार केंद्रों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल सकता है। CRE से होने वाले संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। CRE के कारण खून में होने वाले संक्रमण से लगभग 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है।

CRE से संक्रमित होने का अधिक जोखिम किसे है?

CRE संक्रमण मुख्य रूप से पुरानी, गंभीर बीमारी वाले मरीजों को प्रभावित करता है। जिन लोगों ने अस्पतालों में बहुत समय बिताया हो, उनमें CRE से संक्रमित या प्रभावित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। CRE के संक्रमण के जोखिम को बढ़ाने वाले अन्य कारकों में निम्नलिखित कारक शामिल हैं:

- लंबे समय तक मैकेनिकल वेंटिलेटर (शवास मशीन) पर रहना।
- शरीर के अंदर लगाए जाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना, जैसे मूत्र कैथेटर, केंद्रीय शिरा कैथेटर या भोजन और शवास नलिकाएं।

CRE मरीजों में कैसे फैलता है?

CRE से संक्रमित या इससे प्रभावित मरीजों के शरीर के तरल पदार्थ और मल में रोगाणु होते हैं, जो उनके आस-पास की जगहों, कपड़ों और चिकित्सा उपकरणों को संदूषित कर सकते हैं। CRE स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों, कपड़ों और अस्पताल में मौजूद अन्य वस्तुओं जैसे कि दरवाजे के हैंडल, बिस्तर की रेलिंग, स्टेथोस्कोप, रक्तचाप मापने वाली कफ और थर्मामीटर को संदूषित कर सकता है। साथ ही यह तेजी से दूसरे मरीजों में फैल सकता है।

हम CRE को फैलने से कैसे रोक सकते हैं?

अस्पतालों में CRE को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निम्नलिखित काम करने चाहिए:

- वे समझें कि रोगाणु कैसे फैलते हैं और सुनिश्चित करें कि वे कपड़ों, हाथों या उपकरणों के माध्यम से दूसरे मरीजों तक न पहुंचें।
- मरीजों की देखभाल करने या मरीज के कमरे में रखी चीजों को छूने से पहले और बाद में हाथ धोएं या सैनिटाइज़ करें।
- संक्रमण फैला सकने वाले मरीजों की देखभाल करते समय उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें - इसमें आमतौर पर गाउन और दस्ताने शामिल होते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों और वस्तुओं को डिसिन्फेक्ट करने के लिए अस्पताल-ग्रेड कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल करें, जिन पर CRE के रोगाणु मौजूद हो सकते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पर्यावरण सेवाओं के कर्मचारी इन उत्पादों का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों।
- साझा उपकरण को किसी मरीज पर इस्तेमाल करने से पहले और बाद में साफ और डिसिन्फेक्ट करें।

अपने घर में CRE को फैलने से रोकने के लिए आपको और आपके परिवार को साफ-सफाई की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए:

- अपने हाथ हमेशा साबुन और पानी से साफ करें:
 - खाना बनाने या खाने से पहले।
 - बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद।
 - किसी भी घाव या चिकित्सा उपकरण को छूने से पहले और बाद में।
- अपने व्यक्तिगत देखभाल के सामान जैसे तौलिये और वॉशक्लॉथ, को दूसरे लोगों को इस्तेमाल न करने दें।
- हो सके तो अपने किसी घाव को पट्टी से ढकें।
- आपके घर में किसी विशेष सफाई की ज़रूरत नहीं है:
 - आपके कपड़े घर के बाकी कपड़ों के साथ सामान्य तरीके से धोए जा सकते हैं।
 - आपके खाने के सभी बर्तन वैसे ही धोए जा सकते हैं, जैसे कि आप आमतौर पर धोते हैं।
- आपको अपने पालतू जानवरों के साथ कोई विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है।

अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या उनके साथ बेहद करीब के संपर्क में हैं जिनके शरीर में चिकित्सा उपकरण लगे हों, उन्हें कोई घाव हो या उनकी इम्यूनोटी कमजोर हो तो मार्गदर्शन के लिए कृपया उनके प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता से बात करें या अपने [स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण](#) को कॉल करें।

CRE के लिए किसे परीक्षण करवाना चाहिए?

अगर कोई मरीज़ CRE से संक्रमित या उससे प्रभावित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हो, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग उन मरीज़ों को CRE के लिए परीक्षण कराने की अनुरोध करता है। परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उनके शरीर पर CRE रोगाणु मौजूद हैं या नहीं।

क्या स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को CRE की पुष्टि के लिए परीक्षण करवाना चाहिए?

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग परिवार के स्वस्थ सदस्यों या उन स्वास्थ्यकर्मियों के परीक्षण का अनुरोध नहीं करता है, जो CRE से संक्रमित या उससे प्रभावित मरीज़ों की देखभाल करते हैं। आमतौर पर, स्वस्थ लोगों को CRE से कोई खतरा नहीं होता है और उन्हें परीक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति CRE के संक्रमण से बीमार हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो अस्पताल उनके घरेलू संपर्कों का परीक्षण करवा सकती है।



DOH 420-500 December 2024 Hindi

इस दस्तावेज़ का अनुरोध अलग प्रारूप में करने के लिए 1-800-525-0127 पर कॉल करें। बहरे या कम सुनने वाले ग्राहक, कृपया 711 ([Washington Relay](#)) पर कॉल करें या doh.information@doh.wa.gov पर ईमेल करें।