


# Рекомендации к получению обновленной вакцины против COVID-19 для детей от 6 месяцев до 4 лет



Обновленная вакцина против COVID-19 сезона 2024/2025 годов может защитить детей младшего возраста от тяжелого течения болезни, госпитализации и даже смерти от COVID-19. Исследования показали, что, хотя вакцины остаются эффективным средством от COVID-19, защита, которую они обеспечивают, со временем снижается.

**Наиболее эффективным способом продления такой защиты остается получение всех необходимых прививок против COVID-19.**

Ознакомьтесь с представленной ниже таблицей, чтобы узнать, сколько доз вакцины против COVID-19 нужно получить вашему ребенку.

| Производитель вакцины | Возраст               | Для невакцинированных детей                                                                                                                                                                                                                                                                                | Для детей, вакцинированных против COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pfizer                | От 6 месяцев до 4 лет | <p><b>1-я доза:</b> обновленная вакцина сезона 2024/2025 годов.</p> <p><b>2-я доза:</b> обновленная вакцина сезона 2024/2025 годов через 3–8 недель после получения 1-й дозы.</p> <p><b>3-я доза:</b> обновленная вакцина сезона 2024/2025 годов не ранее чем через 8 недель после получения 2-й дозы.</p> | <p><b>Ребенок получил 1 дозу вакцины:</b></p> <p>2-я доза обновленной вакцины сезона 2024/2025 годов через 3–8 недель после 1-й прививки.</p> <p>3-я доза через 8 недель после получения 2-й дозы обновленной вакцины сезона 2024/2025 годов.</p> <p><b>Ребенок получил 2 и более доз вакцины:</b></p> <p>1 доза обновленной вакцины сезона 2024/2025 годов не ранее чем через 8 недель после последней прививки.</p> |
| Moderna               | От 6 месяцев до 4 лет | <p><b>1-я доза:</b> обновленная вакцина сезона 2024/2025 годов.</p> <p><b>2-я доза:</b> обновленная вакцина сезона 2024/2025 годов через 4–8 недель после получения 1-й дозы</p>                                                                                                                           | <p><b>Ребенок получил 1 дозу вакцины:</b></p> <p>1 доза через 4–8 недель после получения последней дозы обновленной вакцины сезона 2024/2025 годов.</p> <p><b>Ребенок получил 2 и более доз вакцины:</b></p> <p>1 доза через 8 недель после получения последней дозы обновленной вакцины сезона 2024/2025 годов.</p>                                                                                                  |
| Novavax               |                       | Вакцина Novavax недоступна для лиц младше 12 лет.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Для людей с иммунной недостаточностью средней или тяжелой степени рекомендации будут отличаться.



\*Людам, недавно перенесшим заражение SARS-CoV-2, следует рассмотреть возможность отсрочки вакцинации против COVID-19 на 3 месяца от момента появления симптомов или получения положительного результата теста (если заражение прошло без симптомов). Исследования показали, что более длительный перерыв между заражением и вакцинацией может привести к улучшенному иммунному ответу организма на вакцинацию. Кроме того, в течение нескольких недель или месяцев после заражения наблюдается низкий риск повторного инфицирования. Принимая решение о том, нужно ли откладывать вакцинацию после заражения, необходимо учитывать отдельные факторы, такие как риск **тяжелого течения заболевания COVID-19**, **уровень распространения COVID-19 в сообществе** или характеристики преобладающего штамма SARSCoV-2.