

您是否应该接受 丙型肝炎检测？



丙型肝炎 (HCV)
病毒可攻击肝脏，
如不及时治疗，
可能会引发肝脏瘢痕和肝癌。



许多人甚至不知道自己已经
感染，因为并未感觉到身体异
样或不适，但却会将病毒传染
给他人。



如果您患有丙型肝炎，
现在有一种安全有效的
治疗方法可以在短短 8
周内将您治愈。

丙型肝炎可能会通过以下途径传播：



共用针头、注射器和其他注射器具，以及共用边缘断裂的玻璃管和用于鼻吸毒品的器具。



共用剃须刀、牙刷和指甲刀。



可能导致出血的性行为，其中肛交的风险更高。



在未获许可的场所接受纹身、永久化妆或身体穿孔。



妊娠和分娩时的母婴传播。



接触丙型肝炎患者的血液。

丙型肝炎不会通过以下途径传播：



共用食物或餐具。



拥抱、亲吻、或牵手。



母乳或母乳/
胸部喂养

哪些人应该接受检测？

在以下情况下，您应该接受丙型肝炎检测：

- 年龄达到 18 周岁及以上（一生中至少进行一次检测）。
- 怀孕（每次怀孕期间进行检测）。
- 目前正在注射毒品（每年至少进行一次检测）。
- 曾经注射过毒品，哪怕只有一次。
- 在未获许可的场所接受过纹身或身体穿孔。
- 感染了艾滋病病毒。
- 在 1992 年 7 月之前接受过血液或器官捐赠。
- 亲生父母在怀孕期间患有丙型肝炎。

如要获取更多有关丙型肝炎检测的信息，请访问：

www.cdc.gov/hepatitis/hcv or www.doh.wa.gov/hepChub