


CÓ NÊN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM VIÊM GAN C KHÔNG?



Viêm gan C (HCV) là một loại virus tấn công gan, có thể gây xơ gan và ung thư gan nếu không được điều trị.



Nhiều người không biết mình bị nhiễm bệnh vì họ không cảm nhận hoặc biểu hiện triệu chứng, nhưng họ có thể truyền virus cho người khác.



Nếu quý vị mắc viêm gan C (HCV), có một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả để chữa khỏi viêm gan C chỉ trong vòng 8 tuần.

VIÊM GAN C CÓ THỂ LÂY NHIỄM THÔNG QUA:



Dùng chung kim tiêm, ống tiêm và các dụng cụ tiêm chích khác, cũng như dùng chung tàu thuốc thủy tinh bị nứt và dụng cụ dùng để hít ma túy.



Dùng chung dao cạo, bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ cắt móng tay.



Quan hệ tình dục có thể gây chảy máu, trong đó rủi ro cao hơn khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn.



Xăm hình, phun xăm thẩm mỹ hoặc xỏ khuyên tại cơ sở không có giấy phép.



Từ mẹ sang con trong giai đoạn mang thai và sinh nở.



Tiếp xúc với máu của người mắc viêm gan C.

VIÊM GAN C KHÔNG LÂY NHIỄM THÔNG QUA:



Ăn chung thức ăn hoặc dùng chung dụng cụ ăn uống.



Ôm, hôn, hoặc nắm tay.



Sữa mẹ hoặc cho con bú

AI NÊN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM?

Quý vị nên xét nghiệm viêm gan C nếu quý vị:

- Từ 18 tuổi trở lên (hãy xét nghiệm ít nhất một lần trong đời).
- Đang mang thai (hãy xét nghiệm trong mỗi lần mang thai).
- Hiện đang tiêm chích ma túy (hãy xét nghiệm ít nhất một lần mỗi năm).
- Đã từng tiêm chích ma túy, dù chỉ một lần.
- Đã xăm hình hoặc xỏ khuyên ở một cơ sở không được cấp phép.
- Nhiễm HIV.
- Đã được nhận máu hoặc ghép tạng trước tháng 7 năm 1992.
- Mẹ quý vị mắc viêm gan C khi đang mang thai quý vị.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ XÉT NGHIỆM VIÊM GAN C, HÃY TRUY CẬP
www.cdc.gov/hepatitis/hcv hoặc www.doh.wa.gov/hepChub