

了解您的丙型肝炎检测结果

请注意:本文件中所含信息并非为医疗建议。请与您的医疗服务提供者沟通, 获取您的检测结果副本, 以及有关检测结果含义的完整解释说明。

丙型肝炎抗体检测

丙型肝炎抗体检测用于检测是否曾暴露于丙型肝炎病毒。该检测旨在针对血液中的丙型肝炎抗体。抗体是人体对丙型肝炎病毒的存在发出的一种反应。类似于“脚印”。抗体可以告诉我们病毒曾经进入过您的身体, 但无法告诉我们病毒是否仍然存在。只有曾经感染过丙型肝炎的人, 血液中才会存在抗体。下表详细解释了一些常见的检测结果, 但也可能会出现其他结果。




检测结果	检测结果的含义	您需要采取哪些行动
非反应性或阴性 	您目前没有感染丙型肝炎。 <ul style="list-style-type: none">· 您曾经暴露于丙型肝炎, 但身体已经击退了感染。· 您没有感染丙型肝炎, 因此不需要治疗。· 如果您在过去 3-6 个月内曾暴露于丙型肝炎, 您的检测结果也可能为阴性, 因为身体还没有足够的时间针对病毒产生抗体。	保护自己免受丙型肝炎感染。 <ul style="list-style-type: none">· 避免共用毒品注射器具 (如针头、注射器、炊具或棉球)、用于口吸或鼻吸毒品的器具, 或可能沾染血液的个人物品 (如剃须刀、指甲刀或牙刷)。· 实施安全的性行为。如果发生无保护或较为激烈的性行为、与多个伴侣发生性行为, 或者如果感染了艾滋病病毒或其他性传播感染, 那么传播丙型肝炎的风险会更高。 如果存在持续暴露风险, 请重新进行检测。 <ul style="list-style-type: none">· 如果您感染了艾滋病病毒、正在服用暴露前预防药物, 或者注射 (毒品、激素、硅胶或维生素), 那么应定期进行检测 (每 6 个月到一年进行一次检测)。
反应性或阳性 	您在生命的某个阶段曾经感染过丙型肝炎, 并且目前可能仍有感染。 <ul style="list-style-type: none">· 您的身体曾暴露于病毒, 并产生了抗体。· 您需要进行额外的检测, 以确定目前是否仍在感染丙型肝炎。	与您的医疗服务提供者讨论后续行动。 <ul style="list-style-type: none">· 您需要进行检测以确认体内是否仍有丙型肝炎病毒。大多数抗体检测呈反应性结果的人体内都存在病毒, 需要进行治疗。 保护他人免受丙型肝炎感染。 <ul style="list-style-type: none">· 避免共用注射器具 (如针头、注射器、炊具或棉球) 或可能沾染血液的个人物品 (如剃须刀、指甲刀或牙刷)。· 实施安全的性行为。如果发生无保护或较为激烈的性行为、与多个伴侣发生性行为, 或者如果有人感染了艾滋病病毒或其他性传播感染, 那么传播丙型肝炎的风险会更高。

了解您的丙型肝炎检测结果

丙型肝炎确认检测结果

丙型肝炎确认检测(有时也称为“丙型肝炎病毒”、“核糖核酸”、“聚合酶链反应”检测)用于确定您目前是否感染丙型肝炎。丙型肝炎抗体检测呈反应性或阳性的人应进行确认检测,以确认其体内是否仍存在病毒。丙型肝炎病毒确认检测旨在检测血液中的病毒。下表详细解释了一些常见的检测结果,但也可能会出现其他结果。



检测结果	检测结果的含义	您需要采取哪些行动
未检测到或阴性 	您目前没有感染丙型肝炎。 <ul style="list-style-type: none">· 您曾经暴露于丙型肝炎,但身体已经击退了感染。· 您没有感染丙型肝炎,因此不需要治疗。	保护自己免受丙型肝炎感染。 <ul style="list-style-type: none">· 避免共用毒品注射器具(如针头、注射器、炊具或棉球)、用于口吸或鼻吸毒品的器具,或可能沾染血液的个人物品(如剃须刀、指甲刀或牙刷)。· 实施安全的性行为。如果发生无保护或较为激烈的性行为、与多个伴侣发生性行为,或者如果感染了艾滋病病毒或其他性传播感染,那么传播丙型肝炎的风险会更高。 如果存在持续暴露风险,请重新进行检测。 <ul style="list-style-type: none">· 如果您感染了艾滋病病毒、正在服用暴露前预防药物,或者注射(毒品、激素、硅胶或维生素),那么应定期进行检测(每6个月到一年进行一次检测)。· 您将终身携带丙型肝炎抗体,并且丙型肝炎病毒抗体检测呈阳性反应。未来也需要重复进行丙型肝炎确认检测,以检查是否再次感染了丙型肝炎。· 每次怀孕时进行检测。
已检测到或阳性 	您目前已感染丙型肝炎。 <ul style="list-style-type: none">· 您目前的血液中存在丙型肝炎病毒。您具有传染性,这意味着您会将病毒传播给其他人。· 您的检测结果可能包括病毒载量,该指标用来衡量您血液中病毒的数量。	寻求针对丙型肝炎的医疗护理和治疗。 <ul style="list-style-type: none">· 丙型肝炎病毒可能会导致肝病、肝癌甚至死亡。请与您的医疗服务提供者沟通这些检测结果的含义以及如何开始丙型肝炎病毒的治疗。· 丙型肝炎病毒的治疗通常需要口服药物8-12周。药物治疗可以治愈大多数患者,而且几乎没有副作用。 保护他人免受丙型肝炎感染。 <ul style="list-style-type: none">· 避免共用毒品注射器具(如针头、注射器、炊具或棉球)、用于口吸或鼻吸毒品的器具,或可能沾染血液的个人物品(如剃须刀、指甲刀或牙刷)。· 实施安全的性行为。如果发生无保护或较为激烈的性行为、与多个伴侣发生性行为,或者如果有人感染了艾滋病病毒或其他性传播感染,那么传播丙型肝炎的风险会更高。



DOH 150-260 May 2024 (CS) Simplified Chinese

如欲索取本文件的其他版本格式,请致电 1-800-525-0127。耳聋或重听人士请拨 711 (Washington Relay) 或发送电子邮件至 doh.information@doh.wa.gov。本文件经 Hepatitis B Foundation 许可改编。