Интерпретация результатов анализа на гепатит С

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Информация в этом документе не является медицинской рекомендацией. Чтобы получить копию результатов и полную расшифровку их значения, обратитесь к своему лечащему врачу.

Анализ на антитела к гепатиту С

Анализ на антитела к гепатиту С выявляет, контактировал ли человек с гепатитом С когда-либо. Он показывает, есть ли у вас в крови антитела к гепатиту С. Антитела — это ответ организма на присутствие вируса гепатита С. Они похожи на следы. Они показывают, что вирус попадал в ваш организм, но не могут сказать, есть ли он сейчас. Антитела можно обнаружить в крови, только если вы когда-либо заражались гепатитом С. Ниже приведена таблица с объяснением наиболее частых результатов анализов, однако показатели могут и отличаться.

Результат	Значение результатов	Рекомендации
Отсутствие реакции, отрицательный результат	**Сейчас вы не заражены гепатитом С.** • Вы контактировали с гепатитом С ранее, но организм поборол инфекцию. • Вы не больны гепатитом С и не нуждаетесь в лечении. • Если вы контактировали с вирусом в течение последних 3–6 месяцев, результат может быть отрицательным, так как организм еще не выработал к нему антител.	**Защитите себя от гепатита С.** • Избегайте совместного использования приспособлений для введения инъекционных наркотиков (например, игл, шприцев, емкостей для нагрева, ватных дисков), принадлежностей для их вдыхания или курения, а также личных вещей, на которых может быть зараженная кровь (например, бритв, кусачек для ногтей, зубных щеток). • Практикуйте безопасные половые контакты. Гепатит С с большей вероятностью распространяется при незащищенных или агрессивных половых актах, актах с несколькими партнерами, а также при наличии ВИЧ или другого заболевания, передающегося половым путем. **Если у вас есть постоянный риск заразиться, сдавайте анализ повторно.** • Если у вас есть ВИЧ, вы проходите доконтактную профилактику или вводите инъекционные наркотические вещества, гормоны, силикон либо витамины, сдавайте анализ регулярно (каждые 6–12 месяцев).
Наличие реакции, положительный результат	**Вы заражались гепатитом С ранее и можете быть заражены сейчас.** • Ваш организм контактировал с вирусом и выработал антитела. • Сдайте дополнительный анализ, чтобы выяснить, заражены ли вы гепатитом С сейчас.	**Обсудите со своим лечащим врачом дальнейшие действия.** • Сдайте анализ, чтобы выяснить, присутствует ли вирус гепатита С в вашем организме. У большинства людей с положительным результатом анализа на антитела в организме присутствует вирус, им требуется лечение. **Защитите других от гепатита С.** • Избегайте совместного использования приспособлений для инъекций (например, игл, шприцев, емкостей для нагрева, ватных дисков) и личных вещей, на которых может быть зараженная кровь (например, бритв, кусачек для ногтей, зубных щеток). • Практикуйте безопасные половые контакты. Гепатит С с большей вероятностью распространяется при незащищенных или агрессивных половых актах, актах с несколькими партнерами, а также при наличии у вас или у партнера ВИЧ или другого заболевания, передающегося половым путем.

Интерпретация результатов анализа на гепатит С

Результаты подтверждающего анализа на наличие гепатита С

Подтверждающий анализ на наличие гепатита С (выявление РНК вируса ВГС методом ПЦР) определяет, заражены ли вы гепатитом С прямо сейчас. Людям, получившим положительный результат анализа на антитела к гепатиту С (с наличием реакции), следует сдать подтверждающий анализ, чтобы узнать, активен ли вирус в организме в настоящий момент. Подтверждающий анализ на ВГС выявляет вирус в крови. Ниже приведена таблица с объяснением наиболее частых результатов анализов, однако показатели могут и отличаться.

Результат	Значение результатов	Рекомендации
Вирус не обнаружен, отрицательный результат	**Сейчас вы не заражены гепатитом С.** • Если вы контактировали с гепатитом С ранее, организм поборол инфекцию. • Вы не больны гепатитом С и не нуждаетесь в лечении.	**Защитите себя от гепатита С.** • Избегайте совместного использования приспособлений для введения инъекционных наркотиков (например, игл, шприцев, емкостей для нагрева, ватных дисков), принадлежностей для их вдыхания или курения, а также личных вещей, на которых может быть зараженная кровь (например, бритв, кусачек для ногтей, зубных щеток). • Практикуйте безопасные половые контакты. Гепатит С с большей вероятностью распространяется при незащищенных или агрессивных половых актах, актах с несколькими партнерами, а также при наличии ВИЧ или другого заболевания, передающегося половым путем. **Если у вас есть постоянный риск заразиться, сдавайте анализ повторно.** • Если у вас есть ВИЧ, вы проходите доконтактную профилактику или вводите инъекционные наркотические вещества, гормоны, силикон либо витамины, сдавайте анализ регулярно (каждые 6–12 месяцев). • У вас сохранятся антитела к гепатиту С на всю жизнь, и анализ на антитела к ВГС всегда будет давать положительный результат. В будущем для проверки на гепатит С сдавайте подтверждающий анализ. • Сдавайте анализ во время каждой беременности.
Вирус обнаружен, положительный результат	**Вы заражены гепатитом С.** • Сейчас у вас в крови присутствует вирус гепатита С. Вы заразны и можете передавать его другим людям. • В результатах может быть указана вирусная нагрузка, показывающая концентрацию вируса в крови.	**Обратитесь за медицинской помощью и лечением гепатита С.** • Вирус ВГС может стать причиной болезни печени, рака и даже смерти. Обсудите со своим лечащим врачом результаты анализа и начало лечения ВГС. • Лечение ВГС предполагает прием лекарств перорально в течение 8–12 недель. Они помогают большинству людей полностью выздороветь и вызывают минимум побочных эффектов. **Защитите других от гепатита С.** • Избегайте совместного использования приспособлений для введения инъекционных наркотиков (например, игл, шприцев, емкостей для нагрева, ватных дисков), принадлежностей для их вдыхания или курения, а также личных вещей, на которых может быть зараженная кровь (например, бритв, кусачек для ногтей, зубных щеток). • Практикуйте безопасные половые контакты. Гепатит С с большей вероятностью распространяется при незащищенных или агрессивных половых актах, актах с несколькими партнерами, а также при наличии у вас или у партнера ВИЧ или другого заболевания, передающегося половым путем.

DOH 150-260 May 2024 (CS) Russian

Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте doh.information@doh.wa.gov. Информация в этом документе адаптирована с разрешения организация Hepatitis B Foundation.