


HECHOS SOBRE LA SÍFILIS PARA PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS

LA SÍFILIS ESTÁ EN AUMENTO

- La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) curable, causada por una bacteria.
- El número de personas diagnosticadas con sífilis en Washington **se triplicó** entre 2016 y 2023.
- Las personas que consumen drogas y las embarazadas se están viendo afectadas por el gran aumento de la sífilis.



CONSEJOS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS

- **Hágase la prueba de sífilis si alguna de las siguientes opciones se aplica a su caso o al de su pareja:**
 - o Ha tenido sexo oral, anal, o vaginal durante el último año y es menor de 45 años.
 - o Está embarazada o intentando embarazarse.
 - o Consume metanfetamina u opioides sin receta, como heroína o fentanilo.
 - o No tiene hogar o tiene una situación de vivienda inestable.
 - o Tiene síntomas como:
 - Una llaga sin dolor en la parte trasera, el pene, la vagina o la boca.
 - Un sarpullido sin picazón en el pecho, la espalda, las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- **Consiga materiales nuevos para el consumo de drogas en un programa de intercambio de jeringas y evite compartir materiales.**
 - o La sífilis suele transmitirse por contacto sexual. Aunque es poco probable contraerla por compartir agujas u otros equipos para inyectarse, usar materiales nuevos y estériles cada vez que se inyecte puede ayudar a prevenir la sífilis y otras infecciones como la hepatitis C, la hepatitis B y el VIH.
 - o Para encontrar un programa de intercambio de jeringas cercano, escanee el código QR que aparece al final de la página.
- **Practique sexo seguro.**
 - o Use condones u otros métodos de barrera, como barreras bucales o guantes de látex.
 - o La doxy PEP es un antibiótico que puede prevenir la sífilis y la clamidia si se toma dentro de las 72 horas inmediatamente después de la relación sexual. Consulte con un médico si la doxy PEP es adecuada para usted.
- **Busque tratamiento si a usted o a su pareja les diagnosticaron sífilis.**
 - o La sífilis se puede curar con antibióticos. Recibir tratamiento puede prevenir la transmisión de la sífilis.

HECHOS SOBRE LA SÍFILIS

- La sífilis se transmite por contacto directo con la piel durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales.
- Puede tener sífilis incluso si no presenta síntomas. Hágase la prueba para saber si tiene sífilis.
- Sin tratamiento, la sífilis puede causar daños graves a los ojos, el cerebro y otros órganos.
- La sífilis puede transmitirse de una persona embarazada a su bebé durante el embarazo y el parto.
- Los bebés infectados con sífilis pueden presentar defectos congénitos graves o hasta morir. Las mujeres embarazadas con sífilis deben recibir tratamiento y curarse lo antes posible para proteger la salud de su bebé.



¿Quiere hacerse la prueba de sífilis?
¡Consulte a un médico o escanee el código QR para encontrar un centro de pruebas cercano!
www.doh.wa.gov/sti-testing



Encuentre un programa de intercambio de jeringas
www.doh.wa.gov/SSPDirectory