

سرب او ستاسو ماشوم



زه څنگه پوه شم چې زما ماشوم د سربو له خطر سره مخ شوی دی؟

هغه ماشومان چې د سربو له خطر سره مخ شوي وي کیدای شي بل ډول بڼکاري نه شي یا عمل ونه کړي. د ویني معاینه د دې معلومولو لپاره غوره لاره ده چې آیا ستاسو ماشوم د سربو له خطر سره مخ شوی دی او که نه.

سرب څنگه کولی شي زما ماشوم ته زیان ورسوي؟

حتی په ټیټه کچه کې، سرب ستاسو ماشوم ته زیان رسولی شي. سرب ستاسو د ماشوم د بدن په ډېرو برخو، په ځانګړې توګه دماغ اغیز کوي. د 6 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان د سربو د زیان رسوونکو اغیزو لپاره تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي.

سرب کولی شي د لاندې مواردو لامل شي:

- د زده کړو او پاملرنې په برخه کې ستونزې
- په اورېدلو او خبرو کولو ستونزې
- ځنډېدلي وده او پرمختګ
- د چلند ستونزې لکه له اندازې زیات فعالوالی او تیري

زما ماشوم چیرته د سربو له خطر سره مخ شو؟

کیدای شي ماشومان د سربو له خطر سره د تنفس کولو یا خورلو له لارې مخ شي. د سربو له خطر د ماشومانو د مخ کېدو تر ټولو عام سرچینه د 1978 کال څخه مخکې جوړ شوي کورونو کې د سرب پر بنسټ رنگ دی. سرب لرونکی زور رنگ کولی شي له منځه لاړ شي او په هغه دورو بدل شي چې یو ماشوم یې تنفس کوي یا یې خوري کله چې دا د دوی په لاسونو یا نورو شیانو ولګیري چې دوی یې په خوله کې اچوي. ځینې وختونه رنگ په لویو ټوټو کې راوتلی شي، چې کیدای شي ځینې ماشومان په خپلو خولو کې یې واچوي. د سرب دورې او ټوټې حتی د زرو کورونو او ودانیو شاوخوا خاورې ته ننوځي یا چیرې چې یو وخت یوه زړه ودانۍ ولاړه وه.

د سرب نورې سرچینې عبارت دي له:

- زرو صنعتي ځایونو ته نږدې خاوره، د پخوانیو باغونو ځمکې او هغه سړکونه چې ډېر سفر پرې شوی وي
- د څښاک اوبه چې د سرب لرونکي پاپیونو یا د نلونو له لارې تیریري
- د میندوارۍ په لړ کې جنین ته یا د مور د شیدو له لارې ماشوم ته لیردول شوی سرب
- د کورنۍ د غړي له کار یا بوختیا څخه کور ته د سرب ذرات ورل کیري
- ځینې فلزي یا رنگ شوي د لویو توکي او د جامو ګاڼې
- ځینې دودیزې درملنې یا د سینګار توکي
- ځینې وارد شوي سیرامیک او المونیمي لوښي

د کورنیو لپاره سرچینې

د سربو له خطر سره مخ کیدل ستاسو د ماشوم دماغ ته زیان رسولی شي، مګر دا پدې معنی نه دي چې دا به تل وي. د ودې اړوند په منظم ډول معاینات کولی شي کورنیو سره مرسته وکړي چې پوه شي چې ایا د دوی ماشومان د لویې کولو، زده کړې، فعالیت ترسره کولو او خبرو اترو په برخه کې مهم پړاوونو ته رسیري.

د ماشومانو د ودې اړوند معایناتو په اړه له خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ یا د واشنگتن د **Help Me Grow** ټیلیفوني شمېرې ته په **1-800-322-2588** زنگ ووهئ.

زموږ سره اړیکه ونیسئ:

1-800-909-9898

lead@doh.wa.gov

نور معلومات ترلاسه کړئ:

doh.wa.gov/lead

ستاسو د ماشوم د معاینې پایلې

د ماشوم نوم: _____ د معاینې پایلې: _____ $\mu\text{g}/\text{dL}$

نېټه: _____ زما ماشوم څه وخت په وینه کې د سربو بلي معاینې ته اړتیا لري؟ _____

که چېرې د معاینې پایلې دلته نه وي لیکل شوي، نو د دې معلوماتو لپاره له خپل ډاکټر، نرس یا د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ.

د خپل ماشوم د معاینې په پایلو پوهیدل

په وینه کې د سربو معاینه مور ته ښيي چې د یو چا په وینه کې څومره سرب (په مایکروگرامونو کې: μg) دي (په هر ډیسی لیټر کې: dL). دا د وینې د سرب کچې په نوم هم پیژندل کېږي. که چېرې ستاسو ماشوم د وینې د سرب کچه $3.5 \mu\text{g}/\text{dL}$ یا لوړه وي، نو ستاسو د ماشوم د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي، Medicaid/Apple Health پلان او/یا د عامې روغتیا ادارې لخوا د تعقیب لپاره تاسو سره اړیکه نیول کېدی شي.

په وینه کې د سربو د معاینې پایله	راتلونکي گامونه
له $3.5 \mu\text{g}/\text{dL}$ څخه کم	سمدستي تعقیبي معاینې ته اړتیا نشته. په خپل راتلونکي لیدنه کې د سرب لپاره د نورو معایناتو په اړه له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ.
$3.5-19 \mu\text{g}/\text{dL}$	د 1 څخه تر 3 میاشتو پورې په وینه کې د سربو د بلي معاینه سپارښتنه کېږي. د خپل ماشوم په چاپیریال کې د سرب احتمالي سرچینې وپېژنئ او لري یې کړئ تر څو په راتلونکي کې له خطر سره د مخ کېدو مخه ونیسئ.
$20-44 \mu\text{g}/\text{dL}$	د 1 څخه تر 4 اونيو پورې په وینه کې د سربو د بلي معاینې سپارښتنه کېږي. د خپل ماشوم په چاپیریال کې د سرب احتمالي سرچینې وپېژنئ او لري یې کړئ تر څو په راتلونکي کې له خطر سره د مخ کېدو مخه ونیسئ.
$45 \mu\text{g}/\text{dL}$ او پورته	سمدلاسه د خپل ماشوم له ډاکټر سره خبرې وکړئ. د 48 ساعتونو دننه په وینه کې د سربو د بلي معاینې سپارښتنه کېږي. کېدای شي ستاسو ماشوم درملو ته اړتیا ولري او په روغتون کې بستر شي.

که زما ماشوم د سربو له خطر سره مخ شي نو زه څه کولی شم؟

پرته له دې چې ستاسو د ماشوم د وینې د سرب کچه $45 \mu\text{g}/\text{dL}$ او څخه پورته وي، د سربو له خطر سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره هیڅ درمل نشته. غوره کار چې تاسو یې کولی شئ دا دی چې د سربو سرچینه وپېژنئ او دې سرچینې ته د خپل ماشوم لاسرسی کم کړئ یا یې لري تری وساتئ. حتی که چېرې ستاسو د ماشوم په وینه کې د سربو لوړه کچه نه وي، تاسو بیا هم کولی شئ دا گامونه پورته کړئ تر څو د دوی د سربو کچه ټیټه وساتئ:

- په مکرر ډول د خپل ماشوم لاسونه په صابون او اوبو سره په ځانگړي توگه د بهر لویې کولو وروسته او د خورلو دمخه ومینځئ.
- که تاسو په هغه کور کې ژوند کوئ یا ډیر وخت تیروئ چې د 1978 څخه دمخه جوړ شوی وي، په منظم ډول د رنګ د ټوټې کیدو، پوستکیدو یا خرابیدو نښې وگورئ. مخکې له دې چې تاسو خپل کور ترمیم، رنګ یا نوی کړئ، د سربو اړوند خوندي کړنو په اړه معلومات په www.epa.gov/lead پته کې ومومئ.
- د لوند ټوکر سره خاورې پاک کړئ او په مکرر ډول یې جارو کړئ.
- د غالی پاکولو پر مهال د HEPA (په لوړه کچه اغیزناک والي سره په هوا کې د زراتو راتلونکي) فلټر سره ویکيوم کلینر یا برقی جارو وکاروئ.
- کور ته د ننوتلو دمخه بوتان لري کړئ تر څو دننه خاوره را نشي. خالي خاوره د خړلو یا اوبنو په واسطه وپوښئ.
- هغه خواره وخورئ چې کلسیم، اوسپنه او ویتامین سي ډیر لري لکه چرګ، مستي، پالک او نارنج.
- که چېرې ستاسو په کور کې څوک د سرب سره کار کوي، نو باید کور ته له ننوتلو دمخه غسل وکړي او جامې بدلې کړي. د کار جامې د نورو جامو څخه جلا ومینځئ.
- د کارولو دمخه د څو دقیقو لپاره خپل د اوبو نلونه خلاص کړئ او یوازې د پخلې او د ماشومانو لپاره د وچو شیدو د مخلوط کولو لپاره سړي اوبه وکاروئ.