

چارت واکسین های ضروری بخاطر مراقبت از طفل برای والدین

دستورالعمل ها: برای دیدن اینکه کدام واکسین ها برای مراکز مراقبت از اطفال نیاز است، سن طفل خود را پیدا کنید و به آن ردیف نگاه کنید تا واکسین ها و دوز های مورد نیاز را پیدا کنید. اطفال باید حداقل فواصل واکسیناسیون و سن را برای برآورده ساختن شرایط داشته باشند. لطفاً اگر سوالی دارید با ارائه دهنده مراقبت های صحتی یا مرکز مراقبت از کودکان خود صحبت کنید.

واکسین آب چیچک	واکسین (سرخکان، کله چرک و سرخکان آلمانی)	واکسین کونجوگه پنوموکوکی	واکسین فلج اطفال	واکسین نوع b انفلونزای هیموفیلوس	اولین واکسینهای طفل شما	واکسین هیپاتیت B	
Varicella	MMR	PCV	Polio	Hib	DTaP	Hepatitis B	
این واکسین معمولاً قبل از 12 ماهگی داده نمیشود.	این واکسین معمولاً قبل از 12 ماهگی داده نمیشود.	دوز 1	دوز 1	دوز 1	دوز 1	دوز 2	در 3 ماهگی
		دوز 2	دوز 2	دوز 2	دوز 2	دوز 2	در 5 ماهگی
		دوز 3	دوز 2	دوز 2-3**	دوز 3	دوز 2	در 7 ماهگی
دوز 1	دوز 1	دوز 4**	دوز 2	دوز 3-4**	دوز 3	دوز 2	16 ماهگی
دوز 1	دوز 1	دوز 4**	دوز 3	جرعات 3-4**	جرعات 4	دوز 3	در سن 19 ماهگی
دوز 2	دوز 2	معمولاً به اطفال 5 ساله و بالاتر داده میشود	دوز 4**	معمولاً به اطفال 5 ساله و بالاتر داده میشود	جرعات 5**	دوز 3	در 7 سالگی یا شروع مکتب/پیش دبستانی در 4 سالگی یا بیشتر.

*اطفالی که در صنف قبل از دوره مکتب- صنف 12ام می روند باید شرایط واکسیناسیون را برای صنف خود در مکتب داشته باشند.
**ممکن است دوزهای واکسین با کمتر از مقدار ذکر شده قابل قبول باشد، نظر به زمان تزریق آنها.

چارت شرایط قبل از دوره مکتب- صنف 12ام و منابع اضافی واکسیناسیون را می توان در این آدرس یافت میشود: <https://doh.wa.gov/vaxtoschool>

معلومات مربوط به سایر واکسین های مهم که برای حضور مراقبت طفل نیاز نیستند را در این آدرس بیابید: <https://www.immunize.org/official-guidance/cdc/rec-schedules/>