

麻疹疫情 — 家庭須知



什麼是麻疹？

麻疹是由麻疹病毒引起的一種傳染性極強的疾病。麻疹最初以發高燒、咳嗽、流鼻涕、紅眼和雙眼流淚開始。三到五天後，面部會開始出現皮疹，並擴散到身體的其他部位。



麻疹透過空氣傳播，當患者咳嗽、打噴嚏或說話時，病毒可感染他人。

麻疹病毒可以在空氣中存活長達兩小時的時間，即使患者離開現場區域後仍具有傳染性。

幫助我們阻止麻疹傳播！

- 1 請確保您和家人已接種麻疹、腮腺炎和風疹疫苗。在免疫接種記錄中，這些疫苗有時會縮寫為 MMR 或 MMRV。
- 2 如果您或家人尚未接種麻疹、腮腺炎和風疹疫苗，請聯絡可信賴的醫療保健服務提供者進行接種。如果沒有固定的醫療保健服務提供者，也可以聯絡當地衛生部門或諮詢當地藥房。
- 3 請與患者保持距離。
- 4 勤用肥皂和清水洗手。
- 5 讓生病的家庭成員待在家中。



入讀學前教育機構、學校及兒童保育機構均須接種 MMR 疫苗。

就讀學前教育機構或兒童保育機構的兒童，需在 16 個月大之前接種一劑 MMR 疫苗。

幼稚園至 12 年級的兒童需完成兩劑 MMR 疫苗接種。

如果學校或兒童保育機構出現麻疹病例，未按規定接種 MMR 疫苗或無法接種 MMR 疫苗的兒童，可能會被禁止入園或入學。

請造訪 <https://doh.wa.gov/zh-hant/you-and-your-family-illness-and-disease-z/mazhen> 瞭解更多資訊！