Washington State Department of Health
(Департамент здравоохранения штата Вашингтон)
График вакцинации взрослых — 2026

Эта прививка должна быть сделана ВСЕМ взрослым из соответствующей возрастной группы.

Эта прививка должна быть сделана НЕКОТОРЫМ взрослым из соответствующей возрастной группы.

Взрослым следует обсудить со своим поставщиком медицинских услуг, показана ли им эта прививка.

	19–26 лет	27–49 лет	50–64 года	65 лет и старше
COVID-19	1 или несколько доз обновленной вакцины от COVID-19			
Flu (вакцина от гриппа)	1 доза ежегодно в сезон гриппа			
RSV (вакцина от респираторно-синцитиального вируса)	1 доза во время беременности, если она приходится на сезон РСВ, или при наличии определенных заболеваний		1 доза для лиц в возрасте от 50 до 74 лет	1 доза для лиц в возрасте 75 лет и старше
Tdap или Td (вакцины от столбняка, дифтерии и коклюша)	1 доза Tdap во время каждой беременности Td/Tdap каждые 10 лет (для всех взрослых)			
MMR (вакцина от кори, эпидемического паротита и краснухи)	1 или несколько доз для людей, родившихся после 1957 года			
VAR / Varicella (вакцина от ветряной оспы)	2 дозы для лиц, родившихся в США после 1980 года		2 дозы	
Zoster (вакцина от опоясывающего лишая)	2 дозы		2 дозы	
HPV (вакцина от вируса папилломы человека)	2–3 дозы (в зависимости от возраста на момент первой вакцинации или состояния здоровья)	3 дозы для лиц в возрасте от 27 до 45 лет		
PCV (пневмококковая конъюгированная вакцина)	1 или несколько доз (в зависимости от типа вакцины)		1 или несколько доз (в зависимости от типа вакцины)	
HepA (вакцина от гепатита A)	2–4 дозы (в зависимости от типа вакцины)			
HepB (вакцина от гепатита B)	2–4 дозы для лиц в возрасте от 19 до 59 лет (в зависимости от типа вакцины или состояния здоровья)			2–4 дозы (в зависимости от типа вакцины или состояния здоровья)
Meningococcal (менингококковая вакцина ACWY)	1 или несколько доз			
MenB (менингококковая вакцина B)	19–23 года	2–3 дозы (в зависимости от типа вакцины или состояния здоровья)		
Hib (*вакцина от гемофильной инфекции* типа b)	1 или 3 дозы (в зависимости от состояния здоровья)			
Mpox	2 дозы			
IPV (инактивированная вакцина от полиомиелита)	1 или несколько доз, если человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации			

Washington State Department of HEALTH

Составлено на основе рекомендованного графика вакцинации American Academy of Family Physicians.

Подробнее см. на странице aafp.org/clinical-insights/immunizations-and-vaccines/immunizations-schedules-resources/adult-immunization-schedules.

DOH 348-1161 CS September 2026 Russian

Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127.
Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay)
или по электронной почте doh.information@doh.wa.gov.