ຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19: ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

Vaccinate WA
CovidVaccineWA.org

ຢາວັກຊີນແມ່ນປອດໄພ

ຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ[1]. ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນນັ້ນໄດ້ຖືກພັດທະນາ, ທົດສອບ ແລະ ອະນຸຍາດໂດຍໃຊ້ ຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມງວດແບບດຽວກັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອື່ນໆ. ວັກຊີນທຸກປະເພດແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໂດຍ U.S. Food and Drug Administration (FDA, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ)—ໝາຍຄວາມວ່າ FDA ບໍ່ພົບບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະຍັງໄດ້ທົບທວນບັນດາການສຶກສາ ແລະ ບໍ່ພົບຄວາມກັງວົນໃຈ. ວັກຊີນຊະນິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຜ່ານການທົບທວນເປັນເອກະລາດໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດໃນກຸ່ມ Scientific Safety Review Workgroup (ກຸ່ມການທົບທວນຄວາມປອດໄພດ້ານວິທະຍາສາດ), ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Western States Pact (ສົນທິສັນຍາຂອງລັດຕາເວັນຕົກ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ). ເບິ່ງ FAQ ຂອງພວກເຮົາສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ວັກຊີນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດຕິຜົນຍ້ອນວ່າມັນຖືກນຳໃຊ້ໂດຍສາທາລະນະ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຫຼາຍລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ເພື່ອເບິ່ງບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈັບພວກເຂົາໄດ້ໄວເມື່ອເກີດຂຶ້ນ. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ມີຄວາມປອດໄພ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ກວດຫາບັນຫາທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນ ໃນລະຫວ່າງການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກ ຂອງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19.

ວັກຊີນຊະນິດດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ຖືພາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງມີໂລກແຊກຊ້ອນ. ເມື່ອມີຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ, ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງແມ່ນມີໜ້ອຍ.

ຢາວັກຊີນໃຊ້ງານໄດ້ດີ

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສາມາດປ້ອງກັນທ່ານໄດ້ ໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນນັ້ນ ແມ່ນມີປະສິດຕິຜົນສູງໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19. ຖ້າທ່ານຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19, ວັກຊີນປ້ອງກັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເຈັບໜັກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນຊ່ວຍ ຫຼຸດໂອກາດໃນການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານຈາກການເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດ COVID-19. ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າຢາວັກຊີນບາງຊະນິດດີກ່ວາຊະນິດອື່ນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກໄດ້ສະແດງເຫັນວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສູງ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງໜ້າ COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness (ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາ) | Washington State Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ Washington) .

ການສຶກສາສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັກຊີນປ້ອງກັນແຕ່ລະຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢ່າງໜ້ອຍ 85 ເປີເຊັນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ປ່ວຍ ຮຸນແຮງ. ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໃດໆ:

- Moderna, 94%
- Pfizer-BioNTech, 95%
- Johnson & Johnson (Janssen), 74%
- Novavax, 90.4%

[1] Centers for Disease Control and Prevention, "Safety of COVID-19 Vaccines (ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດ COVID-19)". ວັນທີ 25 ມີນາ 2021, ມີໃນອອນໄລນ່ທີ່: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.

ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ

ທ່ານຈະບໍ່ຕິດພະຍາດ COVID-19 ຈາກການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນອື່ນໆ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີຜົນຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ. ບາງຄົນມີຄວາມບໍ່ສະບາຍເລັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ ຈຳກັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ. ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນອາການທີ່ວ່າຢາວັກຊີນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່. ສຳລັບຢາວັກຊີນທີ່ສັກສອງເຂັມ, ຜົນຂ້າງຄຽງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງທີສອງອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເວລາໃຫ້ຕົວທ່ານເອງພັກຜ່ອນ ແລະ ຟື້ນຕົວໃນມື້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາ. ຜົນຂ້າງຄຽງມັກຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກສອງສາມມື້. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ພົບຜົນຂ້າງຄຽງ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກຳລັງສ້າງການປົກປ້ອງຈາກເຊື້ອພະຍາດໄວຣັສ COVID-19. ສຳລັບບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຕ້ອງສັກສອງເຂັມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຢາຄັ້ງທີສອງແລ້ວ. ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ຈົນກ່ວາສອງອາທິດຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ປາກົດຕາມກຸ່ມອາຍຸ

ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ - 3 ປີ	4–17 ປີ	ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ
ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ປາກົດສາມາດປະກອບມີ	ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ປາກົດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີສອງ.	ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ປາກົດສາມາດປະກອບມີ
ເຈັບຂາ ຫຼື ເຈັບແຂນຢູ່ບ່ອນສັກຢາ	ເຈັບ, ບວມ, ແລະ ແດງຢູ່ບ່ອນສັກຢາ	ເຈັບ, ບວມ, ແລະ ແດງຢູ່ບ່ອນສັກຢາ
ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງບວມ	ອິດເມື່ອຍ	ອິດເມື່ອຍ
ອາການຄັນຄາຍ ຫຼື ໄຫ້	ເຈັບຫົວ	ເຈັບຫົວ
ຄວາມງ້ວງນອນ	ປວດກ້າມເນື້ອ ຫຼື ຂໍ້ຕໍ່	ເຈັບກ້າມ
ການສູນເສຍຄວາມຢາກອາຫານ	ໜາວສັ່ນ	ໜາວສັ່ນ ແລະ/ຫຼື ເປັນໄຂ້
	ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງບວມ	ປວດຮາກ

ອາການຂອງອາການແພ້ຢາ

ອາການແພ້ຕໍ່ຢາວັກຊີນແມ່ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັນກໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້. ຄລີນິກຈະຕິດຕາມທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີຫຼັງຈາກການສັກຢາຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີອາການແພ້. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮູ້ວິທີຊ່ວຍທ່ານ.

ໂທ 911 ຖ້າທ່ານມີອາການແພ້ຫຼັງຈາກອອກຈາກຄລີນິກ. ບັນດາອາການຂອງປະຕິກິລິຍາແພ້ຢາປະກອບມີ: ມີບັນຫາທາງຫາຍໃຈ, ໃບໜ້າ ແລະ ຄໍບວມ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ເປັນຜື່ນທີ່ບໍ່ດີທົ່ວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ວິນຫົວ, ແລະ ອ່ອນເພຍ.

ຊ່ວຍພວກເຮົາເບິ່ງແຍງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ

ລົງທະບຽນສຳລັບ V-safe ເພື່ອລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງໃດໆ: vsafe.cdc.gov. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານຊ່ວຍພວກເຮົາຮັກສາວັກຊີນໃຫ້ປອດໄພສຳ ລັບທຸກໆຄົນ.

ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢາວັກຊີນຂອງທ່ານຍັງສາມາດລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ລະບົບລາຍງານເຫດການທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາວັກຊີນ). FDA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ແລະ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ Washington) ໃຊ້ VAERS.

ທ່ານສາມາດສົ່ງບົດລາຍງານທີ່ vaers.hhs.gov. ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີ VAERS ແລະ ຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາເຮັດວຽກທີ່ www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety.

ປະຊາຊົນຈາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດ ແລະ ຫຼາຍຊົນເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງດັ່ງກ່າວ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ທົດສອບແຕ່ລະວັກຊີນນຳຫຼາຍສິບພັນຄົນ.

ການທົດລອງວັກຊີນປ້ອງກັນ **Moderna** (ສະຫະລັດ) [2]
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:



ການທົດລອງວັກຊີນປ້ອງກັນ **Pfizer-BioNTech** (ສະຫະລັດ) [3]
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:



ການທົດລອງວັກຊີນປ້ອງກັນ **Johnson & Johnson** (ທົ່ວໂລກ) [4]
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:



ການທົດລອງວັກຊີນປ້ອງກັນ **Novavax** (ສະຫະລັດ) [5]
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:



[2] Food and Drug Administration. "FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine ", Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນດ້ານຊີວະພາບ). ວັນທີ 17 ທັນວາ 2020, ມີໃນອອນໄລນ່ທີ່: https://www.fda.gov/media/144434/download.

[3] Food and Drug Administration. "FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine", Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee. ວັນທີ 10 ທັນວາ 2020, ມີໃນອອນໄລນ່ທີ່: https://www.fda.gov/media/144245/download.

[4] Food and Drug Administration. "FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19", Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee. ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021, ມີໃນອອນໄລນ່ທີ່: https://www.fda.gov/media/146217/download.

[5] Food and Drug Administration. "FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine", Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee. ວັນທີ 7 ມີຖຸນາ 2022, ມີໃນອອນໄລນ່ທີ່: https://www.fda.gov/media/158912/download.

✦ AIAN/NHOPI ສະແດງເຖິງຂໍ້ມູນລວມສຳລັບຊາວອາເມລິກາອິນເດຍ, ຊາວອາລາສກາພື້ນເມືອງ ແລະ ຊາວຮາວາຍພື້ນເມືອງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງຊາວເກາະປາຊີຟິກອື່ນໆ.

ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ພະນັກງານຄລີນິກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ

ອາການແພ້

- CDC ມີຄຳແນະນຳສັກຢາວັກຊີນສຳ ລັບຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີອາການແພ້ຕໍ່ສ່ວນປະກອບໃນຢາວັກຊີນ. ຢາວັກຊີນບໍ່ມີອາການແພ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັບຢາທີ່ພົບໃນອາຫານ, ສະນັ້ນອາການແພ້ອື່ນໆສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຄວນເປັນຄວາມກັງວົນເມື່ອໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງ ກັນພະຍາດ COVID-19.
- ອາການແພ້ຕໍ່ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ມັກຖືກຄິດວ່າເກີດຈາກໄຂມັນໃນຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ polyethylene glycol (PEG) ແລະ polysorbate.
- ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັກຊີນປ້ອງກັນອື່ນໆ, ວັກຊີນປ້ອງກັນປະກອບດ້ວຍໄຂມັນ, ເກືອ, ແລະ ນ້ຳຕານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກດີຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ. ສ່ວນປະກອບທັງໝົດມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບບັນດາຢາວັກຊີນເພື່ອທຳໜ້າທີ່ຂອງມັນ.
- ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນບໍ່ມີໄຂ່, ບໍ່ມີລາເຕັກ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາ. ວັກຊີນບໍ່ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍໃນໄຂ່

ຈັນຍາບັນ

ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນສຳລັບພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ຈຳ ເປັນສຳລັບບັນດາຢາວັກຊີນເພື່ອທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ແມ່ນຜະລິດຢູ່ພາຍໃນຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຫ້ອງທົດລອງເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມາຈາກຈຸລັງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 35 ປີກ່ອນ. ວັກຊີນອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງໂຣກ ໝາກສຸກ, ໂຣກຫັດ, ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ A, ຖືກສ້າງຂຶ້ນຄືກັນ. ວັກຊີນໃດໆທີ່ບໍ່ມີຈຸລັງຂອງມະນຸດ (ລວມທັງຈຸລັງທີ່ເປັນໄພ), ເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19, ລາເຕັກ, ສານກັນບູດ ຫຼື ການປ້ອງກັນຕ່າງໆ, ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດຕ່າງໆ ລວມທັງຊີ້ນໝູ ຫຼື ວຸ້ນ. ວັກຊີນບໍ່ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍໃນໄຂ່ ແລະ ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໄຂ່.

ສຳລັບວັກຊີນປ້ອງກັນ Pfizer ແລະ Moderna, ປະມານ 30% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງວັກຊີນໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ຫຼື ຄົນທີ່ມີສີອື່ນໆ ແລະ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ສຳລັບວັກຊີນປ້ອງກັນ Johnson & Johnson, ຢ່າງໜ້ອຍ 38% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງວັກຊີນປ້ອງກັນທັງໝົດທີ່ລະບຸເປັນສີດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ຄົນຜິວໜັງ ແລະ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ.

ອາການທາງການແພດ

- ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນສຳລັບຄົນທີ່ມີອາການທາງການແພດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ ຊາວ ຫາ 45% ໃນການທົດລອງວັກຊີນແຕ່ລະຄັ້ງມີອາການເຊັ່ນ: ໂລກອ້ວນ, ໂຣກເບົາຫວານ, ໂຣກຫົວໃຈ, ໂຣກຕັບ ແລະ ໂລກ HIV.
- ເຖິງວ່າວັກຊີນທີ່ພວກເຮົາມີຈະມີປະສິດທິພາບ 90% ເມື່ອທຽບກັບສາຍພັນຂອງໄວຣັສສ່ວນໃຫຍ່, ຈາກການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງບໍ່ໄດ້ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ແຂງແຮງສະເໝີໄປ. ການສັກຢາເພີ່ມເຕີມທີສາມ, ກ່ອນທີ່ຈະສັກເຂັມກະຕຸ້ນ, ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານພຽງພໍກັບຊຸດວັກຊີນສອງເຂັມ.
- ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດໃນການຖືພາ ແລະ ການເກີດ ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືພາ, ຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ່ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະຖືພາ. ຂໍ້ມູນສະແດງວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ ໃນຊ່ວງໄລຍະຖືພາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບາງການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພໍ່ແມ່ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ແມ່ນສາມາດສົ່ງພູມຄຸ້ມກັນຕ້ານທານພະຍາດ COVID-19 ໄປໃຫ້ກັບລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານການຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ. ຄົນຖືພາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງຈາກພະຍາດ COVID-19, ລວມທັງການເສຍຊີວິດ. ຢາວັກຊີນແມ່ນປ້ອງກັນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

Washington State Department of Health

DOH 348-799 October 2022 Lao

ເພື່ອຂໍເອົາເອກະສານນີ້ໃນຮູບແບບອື່ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ຫູໜວກ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນ, ກະລຸນາໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼື ອີເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov.