

這是不是 COVID-19 或疫苗反應？

COVID-19 症狀

不會因接種疫苗而出現：

咳嗽

呼吸急促

流鼻涕

喉嚨痛

味覺或嗅覺喪失

如果您出現上述症狀並且認為自己可能患上 COVID-19，請尋求醫療諮詢。您可能需要接受 COVID-19 檢測。

疫苗反應

與 COVID-19 症狀相似：

發燒

疲勞

肌肉酸痛

腹瀉

噁心

頭痛

疫苗反應會在一兩天內消失。如果您感覺病情很重，請考慮尋求醫療諮詢。

疫苗反應

不會伴隨 COVID-19 疾病出現：

注射部位疼痛、
發紅或腫脹

如果上述任何反應妨礙您從事正常活動（繫鞋帶、打字等），請尋求醫療諮詢。

COVID-19 疫苗**不會**引發 COVID-19 疾病。

COVID-19 疫苗**不會**導致 COVID-19 PCR 陽性檢測結果。

如果您剛剛檢測出 COVID-19 陽性結果，請遵守隔離指南，具體詳見：[COVIDvaccineWA.org](https://www.covidvaccine.wa.gov)

COVID-19 正在華盛頓州廣泛傳播。由於疫苗要在最後一劑注射完畢的 **2 週**後才能完全生效，在此之前如您接觸過病毒仍有可能感染 COVID-19，即使您已接種一劑或兩劑疫苗。如果您在接種疫苗後感覺不適，此圖表將幫助您弄清楚自己是出現了疫苗反應還是可能感染了 COVID-19。

接種疫苗人員的一般注意事項：如果您在接種疫苗後的 72 小時內發燒（體溫超過 100.5 華氏度），請待在家中。如果您的發燒症狀在 48 小時內消失，並且未出現其他跡象/症狀，您就可以返回工作崗位。如果您在 48 小時後仍然發燒，或是出現可能是感染了 COVID-19 的其他症狀，則應繼續待在家中並接受 COVID-19 檢測。



DOH 820-124 April 2021 Chinese (Traditional)

若您需要本文檔的其他格式，請致電 1-800-525-0127。失聰或聽障客戶，請撥打 711 (Washington Relay) 或發送電子郵件至 civil.rights@doh.wa.gov。