

เป็นผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

โรคโควิด-19

ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการฉีดวัคซีน:

ไอ

หายใจลำบาก

น้ำมูกไหล

เจ็บคอ

สูญเสียความสามารถ

ในการรับรสหรือกลิ่น

หากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้น และคุณคิดว่าคุณอาจติดเชื้อโควิด-19 ให้ปรึกษาแพทย์ คุณอาจจำเป็นต้องทำการทดสอบโควิด-19

ผลข้างเคียงของวัคซีน

ที่คล้ายกับอาการของโรคโควิด-19:

มีไข้

อ่อนเพลีย

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ท้องเสีย

อาการคลื่นไส้

ปวดศีรษะ

ผลข้างเคียงของวัคซีนควรหายไปภายในหนึ่งหรือสองวัน หาก คุณรู้สึกไม่สบายลอง ขอคำแนะนำจากแพทย์

ผลข้างเคียงของวัคซีน

ไม่มีผลกับอาการเจ็บป่วยจากโควิด-19

อาการปวด

ผื่นแดง หรือ

มีอาการบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน

หากเกิดผลข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ (ผูก รongเท้า การพิมพ์ ฯลฯ) ให้ปรึกษาแพทย์

วัคซีนป้องกันโควิด-19 **ไม่ได้** เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19

วัคซีนป้องกันโควิด-19 **ไม่ได้** ทำให้ผลการทดสอบโควิด-19 PCR เป็นบวก

หากคุณเพิ่งได้รับผลการทดสอบโควิด-19 เป็นบวก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจแยกเชื้อได้ที่: **COVIDvaccineWA.org**

เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดในรัฐวอชิงตัน เนื่องจากวัคซีนยังไม่ออกฤทธิ์เต็มที่จนกว่าจะครบ **2 สัปดาห์**ที่จะได้รับยาครั้งสุดท้าย จึงเป็นไปได้ว่าคุณสามารถที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 หากได้รับเชื้อก่อนเวลาดังกล่าว แม้ว่า你会ได้รับวัคซีนหนึ่งหรือสองครั้งก็ตาม หากคุณรู้สึกไม่สบายตัวหลังจากได้รับวัคซีนแล้วแผนภูมินี้จะช่วยให้คุณทราบว่า คุณมีปฏิกิริยากับวัคซีนหรือไม่ หรือคุณอาจมีเชื้อโควิด-19

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน: หากคุณมีไข้ (อุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียส (100.5 องศาฟาเรนไฮต์)) ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน ให้อยู่แต่ที่บ้าน หากไข้ของคุณหายไปภายใน 48 ชั่วโมง และคุณไม่มีสัญญาณ/อาการอื่นๆ ที่แสดงถึงอาการของโควิด-19 คุณสามารถกลับไปทำงานได้ หากคุณยังคงมีไข้หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง หรือมีอาการอื่นๆ ที่อาจเป็นการติดเชื้อโควิด-19 คุณควรอยู่ที่บ้านต่อไปและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19



DOH 820-124 April 2021 Thai

หากต้องการขอเอกสารนี้ในรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127 สำหรับลูกค้าที่มีอาการหูหนวกหรือมีปัญหาคำได้ยิน โปรดโทร 711 (Washington Relay) หรืออีเมล civil.rights@doh.wa.gov