



납 경고

납은 귀하의 자녀에게 해독을 끼칠 수 있습니다

납이 어떻게 우리 아이를 해할 수 있습니까?

극히 적은 양의 납이라도 귀하의 자녀를 해할 수 있습니다. 납이 귀하 자녀의 신체에 흡입될 경우, 자녀가 다음 활동을 하는데 힘들게 됩니다:

- 학습
- 주의력 집중
- 적절한 행동

납중독의 증상은 무엇입니까?

납에 중독된 대부분의 아동들은 아파보이거나 아픈 행동을 하지 않습니다. 귀하의 자녀가 납에 중독되었는지는 오직 혈액 검사를 통하여서만 알 수 있습니다. **귀하의 자녀가 납에 노출되는 상황을 줄이며 납 검사를 받는 데에 관하여 자녀의 의사 혹은 간호사와 상담하십시오.**

누가 납 검사를 받아야 합니까?

이하 아동들은 납 검사를 받아야 합니다:

- 1978년도 이전에 건축된 주택에, 특히 수리 공사를 할 경우, 거주하거나 그러한 주택을 정기적으로 방문하는 아동
- 페인트 칠한 가구 또는 창턱을 깨무는 아동
- 금속 장난감, 페인트 칠한 장난감 혹은 보석을 입에 집어 넣는 아동
- 페이루아(paylooah) 혹은 서마(surma) 등과 같은 전통적인 치료 요법을 받은 아동
- 직장이나 취미 활동을 통하여 납에 노출된 개인들과 접촉하는 아동
- 최근에 타국에서 이민을 왔거나 입양된 아동



PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND
HEALTHIER WASHINGTON

아동들 납중독의 원인은 무엇입니까?

구식 주택에서 발산되는 페인트 납 티끌 또는 조각 등이 노출의 가장 큰 출처입니다. 자녀들이 벗겨지는 페인트 및 석고 등에 가까이 접하지 않도록 주의하십시오.

납 티끌이 아동들의 손이나 장난감에 묻혀질 수 있습니다. 아동들이 손이나 장난감을 입에 넣을 시 납을 삼키게 됩니다. 납 먼지를 깨끗이 행구도록 자녀들의 손과 장난감을 자주 씻어주십시오.

다음과 같은 주택 내 물품들에도 납이 함유되어 있습니다:

- 흙 또는 물
- 비닐 제품
- 장난감 및 보석류
- 수공 도자기

상세한 안내

워싱턴 주 보건국

(Washington State Department of Health)

아동 납중독 방지

(Childhood Lead Poisoning Prevention)

1-800-909-9898

www.doh.wa.gov/ehp/lead

미국 소비자 상품 안전 위원회

(US Consumer Product Safety Commission)

납에 관련된 장난감 회수

(Recalls Related to Lead in Toys)

1-800-638-2772

www.cpsc.gov/recentrecalls.html



DOH 334-141 AUGUST 2008 KOREAN