

# តើលោកអ្នកអាចធ្វើតេស្តមើលរោគរលាក ថ្លើមជំពូក B ឬចាក់ថ្នាំការពារនៅកន្លែងណាដែរ?

- ◆ ចូរសាកសួរលោកគ្រូពេទ្យឬមន្ទីរមើលជំងឺរបស់លោកអ្នកអំពីការធ្វើតេស្តមើលរោគរលាកថ្លើមជំពូក B ។ សួរអំពីការចាក់ថ្នាំការពាររោគរលាកថ្លើមជំពូក B សម្រាប់អ្នក, កូនរបស់លោកអ្នក ហើយនិងសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។
- ◆ បើសិនជាលោកអ្នកពុំមានគ្រូពេទ្យទេ ចូរទូរស័ព្ទមកក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់លោកអ្នកសួរគេមើល តើគេធ្វើតេស្តមើលរោគរលាកថ្លើមជំពូក B ឬចាក់ថ្នាំការពារឬអត់។



ការពារខ្លួនលោកអ្នក, កូនរបស់លោកអ្នកហើយនិងសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឱ្យផុតពីរោគរលាកថ្លើមជំពូក B នេះ។ ការចាក់ថ្នាំការពាររោគរលាកថ្លើមជំពូក B ត្រូវចាក់បីលើកអាចជួយការពារ លោកអ្នកឱ្យរួចផុតពីរោគជំងឺកាចសាហាវនេះ។ បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីរោគរលាកថ្លើមជំពូក B សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ, ក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ របស់លោកអ្នកឬក៏ សុខុមាលភាពមាតា សុខុមាលភាពទារក (Healthy Mothers, Healthy Babies) តាមរយៈលេខ 1-800-322-2588។




1-800-322-2588  
Information and Referral Line

A service of  
Healthy Mothers, Healthy Babies  
Coalition of Washington

ដើម្បីស្នើសុំការបោះពុម្ពនេះ  
ជាភាសាផ្សេងទៀត  
សូមទូរស័ព្ទទៅ

1-800-525-0127

DOH PUB 348-046 (7/98)

# តើជនជាតិអាស៊ី និងជនជាតិរស់នៅ កោះប៊ីស៊ីហ្វិក ចាំបាច់ត្រូវយល់អំពីរោគរលាកថ្លើមជំពូក B ដូចម្តេចដែរ?



ជនជាតិអាស៊ីនិងជនជាតិកោះប៉ាស៊ីហ្វិកអាចកើតរោគរលាកថ្លើមជំពូក B ច្រើន ជាងជនជាតិដទៃ ដោយសារ ពួកគេចាត់ទុកថា រោគរលាកថ្លើមជំពូក B នេះ ជាជំងឺរាតត្បាតមួយ ដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍, ប្រទេសចិន ហើយនិងកោះប៉ាស៊ីហ្វិក។



### តើរោគរលាកថ្លើមជំពូក B គឺជារោគអ្វីដែរ?

រោគនេះគឺជារោគដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបណ្តាលមកពីមេរោគវិរុស (វិសាណូ) ធ្វើឱ្យខូចថ្លើម។ វាធ្វើឱ្យខូចថ្លើម, ក្លាយទៅជាមហារីកថ្លើមហើយ ដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទៀតផង។

មនុស្សជាច្រើនកើតរោគរលាកថ្លើម តែអត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទេ ហើយមិនដឹងថា ខ្លួនកើតរោគនោះផង។ ពួកគេអាចចម្លងរោគនោះទៅកូន ចៅរបស់គេ និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតដោយមិនដឹងខ្លួន។

ទារកនិងកូនក្មេងទាំងឡាយកើតរោគរលាកថ្លើមជំពូក B អាចកើតរោគនេះអស់មួយជីវិតហើយកើតជាជំងឺថ្លើមពេលធំពេញវ័យ។

### តើរោគរលាកថ្លើមជំពូក B នេះឆ្លងតាមរបៀបណាដែរ?

រោគនេះឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតតាមរយៈឈាមកើតរោគនោះ ឬតាម រយៈទឹកក្នុងខ្លួន។ វាអាចឆ្លង :

- ◆ តាមការរួមរក្សាផ្លូវភេទ
  - ◆ ពីម្តាយទៅទារកពេលឆ្លងទន្លេ
  - ◆ តាមការប្រើម្ហូបចាក់ថ្នាំចូលគ្នា, ឡាមកោរពុកមាត់, ក្រវិលឬក៏ ច្រាសដុះធ្មេញ
  - ◆ ដោយទំពារអាហារបញ្ចុកកូនក្មេង
- រោគរលាកថ្លើមជំពូក B ធម្មតាមិនឆ្លងតាម :
- ◆ ការកណ្តាល់
  - ◆ ក្តីក
  - ◆ ប្រើប្រាស់ចានជាមួយគ្នា
  - ◆ កាន់ដៃគ្នា
  - ◆ ទឹកដោះម្តាយ

ទោះបីអ្នកកើតរោគរលាកថ្លើមជំពូក B ក៏ដោយ អ្នកអាចបំបៅដោះកូនដោយសុវត្ថិភាព ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវឈប់ភ្លាមបើសិនជាក្បាលដោះរបស់អ្នកប្រេះឈាមឬក៏ដំបៅតាមដោះ។

បើសិនជាលោកអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកណាកើតរោគរលាកថ្លើមជំពូក B លោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន។ ទៅឱ្យគេធ្វើតេស្តមើលរោគនេះភ្លាម ហើយបើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំការពារទេ ទៅចាក់ថ្នាំការពារទាំងបីលើកដើម្បីការពារខ្លួនលោកអ្នក។

### តើអ្នកណាខ្លះត្រូវការចាក់ថ្នាំការពាររោគរលាកថ្លើមជំពូក B ?

- ◆ បើសិនជាលោកអ្នកជាពូជពង្សនៃជនជាតិអាស៊ីឬក៏ជនជាតិនៃកោះប៉ាស៊ីហ្វិក នេះជាការសំខាន់ណាស់ បើលោកអ្នកនិង ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៅធ្វើតេស្តមើលរោគរលាកថ្លើមជំពូក B នេះ។ បើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំការពារ លោកអ្នកអាច ចាក់ចំនួនបីដងដើម្បីការពារឱ្យផុតពីរោគនេះ ។
- ◆ គ្រប់ទារកទាំងអស់កើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាក់ថ្នាំការពាររោគរលាកថ្លើមជំពូក B ឱ្យបានបីលើក។
- ◆ បើសិនជាកូនលោកអ្នកកើតនៅប្រទេសផ្សេង ឬបើសិនជាលោកអ្នកមិនច្បាស់ថា កូនលោកអ្នកបាន ចាក់ថ្នាំការពារនេះហើយឬនៅ ចូរសាកសួរគ្រូពេទ្យឬក៏មន្ទីរ មើលសុខភាពរបស់អ្នកឱ្យគេដែកមើលឱ្យបានច្បាស់លាស់ថា កូនលោកអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារហើយឬនៅ។

